Tolterodine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療膀胱過動症。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動，直到您發現該藥的影響。

2. 在飲酒或服用其他會造成您行動遲緩的藥物和天然滋補品前，請告知您的醫師。
3. 曾經發生使用此藥後出現稱作血管性水腫的嚴重反應。有時，這可能會危及生命。徵候可能包括雙手、顏面、嘴唇、雙眼、舌或喉嚨腫脹；呼吸困難；吞嚥困難；或嗓音異常嘶啞。如果您有以上任何症狀，請立即尋求醫療協助。
4. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。 您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。
5. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。 您將必須討論對嬰兒造成的風險。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-848-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Tolterodine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：眩暈、嗜睡、頭痛、腹痛、便秘、口乾、眼睛乾澀。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 跳過未服的藥物，繼續按照您的療程服藥。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 避光。
3. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
4. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-848-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您