Topiramate

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療癲癇。
2. 此藥用於預防偏頭痛。
3. 您此藥可能因其他原因而給您服用。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 服用此藥後曾出現排汗減少和體溫過高的問題。過去有些時候，這些問題曾導致病患必須前往醫院接受治療。於高熱天氣下及動態活動時，請務必小心。若您發燒，或是在動態活動時或在高溫下並未排汗，請立即致電聯絡您的醫師。

3. 服用此藥的病患可能有較高的風險會產生自殺的想法或行為。若有憂鬱症、神經緊張、心神不定、抱怨不休、恐慌症發作，或情緒或行為產生變化或較以往更為嚴重時，請立即聯絡醫師。
4. 在某些案例中，此藥會影響兒童和青少年的成長發育。可能需要定期檢查他們的成長發育狀況。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-849-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Topiramate

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

5. 此藥可能會導致酸性血液問題（代謝性酸中毒）。兒童及有腎臟問題、呼吸問題或腹瀉的患者，其發生率可能更高。若您使用某些其他藥物、接受手術或正在接受生酮飲食，發生率也可能更高。經過一段時間後，代謝性酸中毒可能會導致腎結石、骨骼問題或孩子的發育問題。
6. 此藥可能增大出血風險。 有時，出血可能危及生命。 請與醫師商洽相關事項。



7. 避孕藥丸和其他利用荷爾蒙的避孕方法可能無法有效防止懷孕。 服用該藥時應再使用其他形式的避孕措施，例如保險套。
8. 如果您在懷孕時服用此藥物，可能會傷害腹中胎兒。若在服用此藥期間您懷孕或試圖懷孕，應立即致電醫師商洽。
9. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。 您將必須討論對嬰兒造成的風險。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-849-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Topiramate

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

10. 此藥可能會導致嚴重的眼睛問題。 若未治療，足以導致持續性失明。 若眼睛出現一些新的症狀，如視力模糊或其他視力上的改變、眼睛疼痛或泛紅，請立刻致電聯絡您的醫師。
11. 將此藥搭配 valproic acid服用會導致體溫低。這還會導致疲倦易累、意識惑亂或昏迷。請告知醫師。

三. 副作用為何？

1. 便秘、腹瀉、胃痛、胃部不適、嘔吐或飢餓感降低、味覺能力的改變、體重減輕、感覺緊張、容易興奮、感覺頭暈、想睡、疲倦或虛弱、頭痛、臉潮紅、普通感冒徵候、關節痛。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，切勿一次服用兩倍劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 室溫避光乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-849-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您