Tranexamic Acid

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療或預防血友病患者拔牙後的出血問題。
2. 此藥用於治療月經出血過多。
3. 此藥可能因其他原因而給您服用。請洽詢您的醫師。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。

2. 遵照醫師指示進行眼部檢查。
3. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。
4. 曾經發生服用此藥後出現血液凝塊的情形。若您曾有血液凝塊，請向您的醫師洽詢。

5. 若兩次經期過後您仍有月經出血過多情形，或是藥物不再有效，請告知您的醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-850-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Tranexamic Acid

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：頭痛、胃痛、背部、肌肉或關節疼痛、鼻塞、肌肉痙攣、感覺疲倦或虛弱、噁心或嘔吐、腹瀉、眩暈。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。 然後，至少在 6 個小時後再服用下一劑量。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-850-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您