# Trihexyphenidyl

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

## 一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療帕金森氏症 (Parkinson's disease)。
2. 該藥是用於治療一些其他藥物引起的副作用。

## 二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。

2. 避免飲酒或其他會造成您行動遲緩的藥物或天然滋補品。
3. 請勿在未告知醫師的情況下即突然停藥。 您可能會有較高的副作用發作風險。 您若需停用此藥物，應該按醫師囑咐緩慢停用。
4. 狹角型青光眼的患者曾發生視力下降的情況。請洽詢您的醫師。
5. 遵照醫師指示接受眼壓和視力檢查。
6. 曾經發生過病患服用此藥後中暑的案例。 於高熱天氣或進行身體活動時，請務必小心。
7. 若您已 60 歲或以上，使用此藥時須小心。您可能會出現更多副作用。



**Last Reviewed Date**
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-854-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

# Trihexyphenidyl

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

## 二. 使用此藥必須注意哪些事項?

8. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。

## 三. 副作用為何？

1. 可能包括：眩暈、噁心或嘔吐、便秘、視力模糊、嗜睡、頭痛、口乾、感覺緊張、容易興奮、體重減輕、心神不定、入睡困難。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。

## 四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

## 五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。



**Last Reviewed Date**
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-854-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您