Progesterone

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於降低正接受雌激素（雌性素）治療的更年期女性發生子宮內膜病變的風險。
2. 此藥用於治療荷爾蒙失調引起的子宮異常出血。
3. 用於治療月經週期不正常的女性。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 若您有糖尿病，請洽詢醫師。此藥可能增高血糖。
3. 此藥目前尚未核准用於兒童。 請與醫師商洽相關事項。
4. 務必定期做乳房檢查和婦科檢查。您也必須依照指示進行乳房自我檢查。
5. 曾經發生接受此藥後出現血液凝塊的病例。可能引起心臟病發作、中風，以及在腿部、肺部或眼睛凝塊。有時血液凝塊可能會致命。
6. 若您需要長時間靜止不動，例如長途旅行、手術後或生病時需臥床靜養，請告知您的醫師。長時間不動會增大血液凝塊風險。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-884-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Progesterone

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

7. 有時候，此藥可能會停止您的經期（月經出血）。這並非避孕的方法。
8. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。您將必須討論對嬰兒造成的風險。



三. 副作用為何？

1. 可能包括：感覺頭暈、想睡、疲倦或虛弱、入睡困難、難增強食慾。頭痛。青春痘。掉頭髮、毛髮增生、腹瀉或便秘噁心或嘔吐、胃痛或痙攣、鼓脹感、乳房增大、乳房觸痛、背部、肌肉或關節疼痛、體重增重或減重、陰道出血或班點、性欲降低。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 室溫乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-884-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您