Valproate Sodium [Valproic Acid and Derivatives]

一. 此藥有哪些作用?

- 1. 此藥用於治療癲癇。
- 2. 此藥用於預防偏頭痛。
- 3. 該藥用於治療雙相障礙。
- 4. 此藥可能因其他原因而給您服用。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

- 1. 避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動,直到您發現該藥的影響。
- 2. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
- 3. 若您無法正常進食或飲水,請洽詢醫師。這包括您 感到不適、禁止飲食或您正在進行某些手術。
- 4. 部分品牌的此種藥物含有花生油成分。若您對花生 過敏,請和您的藥劑師確認您的品牌中是否含有花 生油成分。
- 您可能會更容易出血。
 小心避免受傷。使用軟
 毛牙刷和電動剃鬚刀。
- 6. 用於兒童時須小心。 請與醫師商洽相關事項。



Last Reviewed Date 2020-03-03 UpToDate



製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

T-C-0210-ED-405-04





Valproate Sodium [Valproic Acid and Derivatives]

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

- 7. 曾經發生使用此藥後出現血氨濃度偏高的情形。這可能導致某些大腦疾病。這曾造成某些人死亡。請 洽詢您的醫師。
- 8. 某些人曾有特定大腦疾患且無高血氨濃度。有時在 停止使用此藥後,大腦疾患通常會回復到正常。不 過,有時不會完全恢復正常。請告知醫師。
- 9. 曾經發生嚴重且有時致命的反應。多數情形下,這 類不良反應包括:發燒樣徵候、皮疹或腺體腫大, 並伴發身體多處器官(如肝臟、腎臟、血液、心臟、 肌肉及關節或肺部)疾患。若您有仁何知明, 持告 知醫師。
- 10.此藥可能會影響生育能力。 請洽詢醫師。
- 11.若您正以母乳餵哺幼兒,請 告知醫師。您將必須討論對嬰兒造成的風險。



T-C-0210-ED-405-04





Valproate Sodium [Valproic Acid and Derivatives]

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記(錯過)一次用藥,該怎麼辦?

- 1. 儘早把忘記用的藥用了。
- 2. 如已接近下一次用藥時間,則跳過錯過的那次用藥量, 隨後回到正常用藥時間。
- 3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
- 五. 我應該如何儲存此藥?
 - 1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
 - 2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童 和寵物都無法觸及的地方。



T-C-0210-ED-405-04



