Valsartan

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療高血壓。
2. 用於治療心力衰竭（心衰竭）。
3. 此藥可在心臟病發作後增強心臟功能。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 可能需要數週才能完全見效。
3. 請遵照指示檢查您的血壓。
4. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
5. 若您正在使用含鉀的鹽替代品、留鉀性利尿劑或鉀補充劑，或者低鹽或無鹽餐，請告知醫師。
6. 飲酒前，先洽詢醫師指示。
7. 於高熱天氣或動態活動時，請務必小心。 喝大量的水以防止脫水。
8. 為降低頭暈或昏厥的機率，若您已坐下或躺下一段時間，應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。
9. 若要讓 6 歲以下兒童服用此藥，須先徵詢醫師意見。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-414-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Valsartan

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

10. 若您過度排汗、體液流失、嘔吐或稀便，請告知您的醫師。 這可能會導致低血壓。
11. 在使用可能引起血壓升高的非處方藥前，先洽詢醫師。這些藥包括咳嗽或感冒藥、減肥藥、興奮劑、布洛芬 (Ibuprofen) 或類似的止痛藥等。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：感覺頭暈、疲倦或虛弱、胃痛或腹瀉、背痛、關節痛、頭痛、流感樣症狀。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
2. 將藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-414-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您