Varenicline

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥可協助您戒菸。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 病患服用此藥後，曾發生過意外的案例，例如車禍。請洽詢醫師建議。
3. 服用此藥時，請勿超過醫師指示的時間長度。
4. 飲酒前，先洽詢醫師指示。
5. 如果您患有驚厥或曾經患過驚厥，請洽詢醫師。
6. 曾經發生使用此藥後出現新的精神、情緒或行為問題或是這類問題惡化。這些問題包括自殺或殺人的念頭、憂鬱症、強迫式行為、暴怒、焦慮症與憤怒。這些問題曾發生在有和沒有心理或情緒問題病史的人身上。請密切留意服用此藥的人。若您認為您有上述任何問題，請立即致電聯絡您的醫師。若您有任何其他病徵，例如神經緊張、心神不定、抱怨不休、恐慌症發作、或情緒或行為產生變化或較以往更為嚴重時，請立即致電聯絡醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-901-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Varenicline

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

7. 當您試圖戒菸時，可能會有尼古丁戒斷症候群 (nicotine withdrawal) 的徵狀，即使您使用這類藥物協助戒菸。有許多尼古丁戒斷症候群 (nicotine withdrawal) 的徵狀。試圖戒菸者很少發生憂鬱症和自殺想法。請告知您的醫師。
8. 曾經發生使用此藥後出現稱作血管性水腫的嚴重反應。有時，這可能會危及生命。徵候可能包括雙手、顏面、嘴唇、雙眼、舌或喉嚨腫脹；呼吸困難；吞嚥困難；或嗓音異常嘶啞。如果您有以上任何症狀，請立即尋求醫療協助。
9. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：噁心或嘔吐、奇怪或怪異的夢、入睡困難、頭痛、便秘、口乾、胃痛、味覺能力的改變、感覺疲倦或虛弱、普通感冒徵候。
4. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-901-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Varenicline

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-901-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您