Venlafaxine

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)


一. 此藥有哪些作用?

- 1. 此藥的作用是治療抑鬱症。
- 2. 此藥的作用是治療焦慮症。
- 3. 此藥用於治療恐慌症發作。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

- 1. 在您明白該藥物對您的影響之前,應避免駕駛、進 行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
- 2. 您您若需停用此藥物,應該按醫師囑咐緩慢停用, 不然可能會有較高的副作用發作風險。
- 3. 曾經發生使用此藥後出現高血壓的案例。遵照醫師指示進行血壓檢測。
- 4. 服用此藥時避免飲酒。
- 5. 此藥可能增大出血風險 出血可能危及生命。
- 6.一些病患在接受此藥後出現眼部疾患的機率可能會增高。醫師可能要求您接受眼睛檢查,以確認此藥是否會增大眼部疾患風險。若您出現眼睛疼痛、視力發生變化、或眼睛內部或週圍腫脹或發紅,應立即致電醫師求助。
- 7. 使用此藥可能引發低血鈉。









Venlafaxine

製定日期:102年9月11日 修定日期:109年7月1日(第4版)

10. 曾經發生使用此藥後出現血脂肪異常症(高膽固醇)的案例。若您有任何疑問,請諮詢醫師。

11. 用於兒童時須小心,此藥會影響兒童和青少年的成長發育。可能需要定期檢查他們的成長發育狀況。


 若您已懷孕或計畫懷孕, 請告知醫師。於懷孕第三孕期 (末期)服用此藥,可能會導 致新生兒發生某些健康問題。

三. 副作用為何?

- 1. 可能包括:入睡困難、感覺緊張、容易興奮、焦慮、 體重減輕、無饑餓感、感覺疲倦或虛弱、嗜睡、眩 暈、顫抖、頭痛、出汗過多、噁心、便秘、氣體、 口乾、奇怪或怪異的夢、哈欠。
- 2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問,請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。



T-C-0210-ED-903-04





Venlafaxine

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記(錯過)一次用藥,該怎麼辦?

- 1. 儘早把忘記用的藥用了。
- 2. 如已接近下一次用藥時間,則跳過錯過的那次用藥量,隨後回到正常用藥時間。
- 3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
- 五. 我應該如何儲存此藥?
 - 1. 存放於室溫下。
 - 2. 儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
 - 3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒 童和寵物都無法觸及的地方。



T-C-0210-ED-903-04

