Mebendazole

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療蟯蟲引起的感染。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 若您使用此藥已有較長時間，請做血液檢驗。請洽詢醫師。
2. 曾發生長期服用此藥後以及劑量過高時造成白血球數量過低和肝臟疾病的情形。請和醫師討論。
3. 用藥量不可超過醫師指示的劑量。用藥頻率或用藥時間不可超過指示。若有上述情形，可能會使出現嚴重副作用的機率增大。
4. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。
5. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：腹痛、腹瀉、無饑餓感、氣體、噁心或嘔吐。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-904-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Mebendazole

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五.我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-904-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您