Diclofenac

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於減輕疼痛。
2. 此藥用於治療部分類型的關節炎。
3. 此藥用於減輕月經期疼痛。
4. 此藥用於治療偏頭痛。
5. 此藥可能因其他原因給您服用。請洽詢您的醫師。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 服用此藥曾出現肝臟疾病。若出現肝臟問題徵候，請立即致電醫師求助；這類徵候包括像是尿液暗色、疲倦、無飢餓感、胃部不適或胃痛、大便淡色、嘔吐，或者皮膚或眼睛泛黃。
2. 若您正接受 aspirin（阿斯匹靈）預防心臟病發作，請與您的醫師詳細商洽。
3. 若您患有苯酮尿症 (PKU)，請告知您的醫生。某些藥品含有苯丙胺酸 (phenylalanine)。
4. 對於心臟衰竭患者，則會提高心臟病發作、因心臟衰竭而須就醫以及死亡的機率。請洽詢您的醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-907-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Diclofenac

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1.如果您在懷孕時服用此藥物，可能會傷害腹中胎兒。若在服用此藥期間您懷孕或試圖懷孕，應立即致電醫師商洽。

2.若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。 您將必須討論對嬰兒造成的風險。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：頭痛、噁心、便秘、眩暈、胃痛或腹瀉、胃灼熱、嘔吐、氣體、嗜睡、出汗、普通感冒徵候。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-907-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您