Azithromycin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療或預防細菌感染。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 請勿持續服用超過指示期間。可能會發生二次感染。
2. 曾經發生嚴重且有時致命的反應。多數情形下，這類不良反應包括發燒樣徵候、皮疹或腺體腫大，並伴發身體多處器官(肝臟、腎臟、血液、心臟、肌肉及關節或肺部)疾患。
3. 若您患有重症肌無力，請告知您的醫師。 若您的徵狀惡化，請聯繫您的醫師。 若您出現肌肉虛弱或更加惡化、咀嚼或吞嚥困難、呼吸困難、眼瞼下垂，或是視力變化，如視覺模糊或重影等現象，連繫您的醫師。
4. 若您已懷孕、計畫懷孕或母乳餵養，請告知醫師。
5. 新生兒服用此藥後曾發生非常嚴重的胃部疾患。若您的孩子出現嘔吐現象或餵食時容易激躁，請立即致電聯絡您的醫師。
6. 此藥可能會導致某一類型的心跳異常(QT 間期延長)。若發生這個情況，可能較有機會引發其他不安全且有時致命的心跳異常。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-982-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Azithromycin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：頭痛、胃痛或腹瀉、噁心或嘔吐。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五.我應該如何儲存此藥？

1. 存放於原包裝內。
2. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Zmax：

1. 混合後，請勿冷藏或冷凍儲存。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-982-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您