Zonisamide

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此此藥用於治療癲癇。
2. 此藥可能因其他原因服用。請洽詢您的醫師。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 此藥所引發的出汗減少情形，主要發生於孩童身上。這種情況曾導致中暑。 請與醫師洽談。
2. 此藥可能會導致酸性血液問題（代謝性酸中毒）。兒童及有腎臟、呼吸問題或腹瀉的患者，發生率可能更高。若您使用某些其他藥物、接受手術或正在接受生酮飲食，發生率也可能更高。經過一段時間後，代謝性酸中毒可能會導致腎結石、骨骼問題或孩子的發育問題。
3. 如同其他可能用於治療癲癇發作的藥物，此藥物可能有輕微增加自殺想法或行為的風險。**此藥未核准用於 16 歲以下的孩童**。 請與醫師洽談。
4. 此藥可能會對胎兒造成傷害。女士在服用此藥時必須使用避孕措施。若此前您在已經懷孕後曾服用過此藥，應將實情告知您嬰兒的醫師。
5. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-984-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Zonisamide

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 酸中毒的症狀：意識惑亂；呼吸急促；心動過速；心跳異常；嚴重胃痛、胃部不適或嘔吐；嚴重嗜睡；呼吸短促；或感到極度疲倦或虛弱。
2. 氨濃度偏高：心跳異常、呼吸異常、意識惑亂、皮膚蒼白、心動過緩、癲癇發作、出汗、嘔吐或抽搐。
3. 其它：平衡感的改變、運動時或在高溫環境下不出汗、高燒、反覆發燒或長期發燒、背痛、腹痛或尿血，可能是腎結石的體徵、無法專心、說話困難。
4. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-984-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您