

# Tramadol --- OTR1

- ✧ 「Tramadol」：

Tramadol 可以用來減緩中到重度的疼痛。
- ✧ 如何服用本品？
  1. 通常必要時每 4~6 時使用一次，請依照處方上的指示服藥，不可擅自增加或減少劑量，亦不可擅自停藥。
  2. 此藥物長期或大量使用易有成癮性，故若無醫師許可不可擅自服用。
- ✧ 注意事項：
  1. 請告訴醫師或藥師，您是否對 tramadol、codeine 或其他藥物有過敏反應。
  2. 如有服用其他處方藥或者非處方藥、止痛藥、抑鬱劑、carbamazepine、MAO 類抑制劑、quinidine、鎮定劑、安眠藥和維他命，請告知您的醫師和藥師。
  3. 如有腎臟、肝臟疾病、癲癇病史或酗酒史，請告知您的醫師。
  4. 如有懷孕、計劃懷孕或哺乳者，請告知您的醫師。
  5. 若曾經有過手術包括牙科手術，請告知您的醫師。
  6. 服用此藥物可能會導致暈眩，在您清楚藥物可能對您的影響前，請勿開車或使用危險機具。
  7. 酒精性飲料會加重此藥導致的嗜睡作用，服用此藥期間請勿飲酒。
- ✧ 忘記服藥時，該怎麼辦？

儘快在您記得時補服，但如遇下次服藥時間，請勿一次服兩個劑量，只需服一次劑量即可。
- ✧ 可能產生的副作用：

包括：嗜睡、視力模糊、胃不適、頭暈、頭痛、腹瀉、嘔吐、心跳過快、臉部紅癢、呼吸困難、排尿困難或癲癇等。
- ✧ 如何貯存？
  1. 將此藥存放於密閉容器內，放置於兒童無法取得之處。
  2. 保存於室溫下並遠離熱源或潮濕環境下。
  3. 如無需在服用藥物或藥物已過期，請將此藥品丟棄。