天成醫療體系

化療藥品衛教單張（民眾版）
艾黴素注射劑（**Doxorubicin**）

外觀	商品名	中文名	學名	規格含量
	Adriblastina® Injection	艾黴素注射劑	Doxorubicin HCl	10mg/vial

懷孕分級：D（FDA）、D（AUS）
授乳分級：Infant risk cannot be ruled out.

一、作用機轉：與去氧核糖核酸(DNA)結合，抑制核酸(nucleic acid)的合成，破壞癌細胞，促使它們死亡。

二、適應症：急慢性白血球過多症、硬瘤、淋巴瘤、軟纖維性肉瘤、交感神經母細胞瘤、乳癌、肺癌。

三、副作用：噁心、嘔吐、腹瀉、白血球減少、血小板減少、口腔黏膜破損、肝功能異常、心臟毒性、掉髮、色素沉著。

四、注意事項：

- 必須特別注意艾黴素的心臟毒性。累積劑量若低於 550 mg/m^2 體表面積，發生心臟失代償作用(decompensation)的風險很低（<1%），若超過該建議劑量限制，則發生心臟失代償作用的風險會大增。

天成醫療社團法人天晟醫院藥劑科
院址：桃園市中壢區延平路 155 號
諮詢專線：03-4629292 轉 22525