天成醫療體系

化療藥品衛教單張（民眾版）
伏摩素注射液（**Paclitaxel**）

外觀	商品名	中文名	學名	規格含量
	Formoxol	伏摩素注射液	Paclitaxel	30mg/5ml/vial

懷孕分級：D（FDA）

哺乳分級：投藥期間應停止哺乳。

一、作用機轉：Paclitaxel 具有獨特的作用機轉，它可影響細胞內的微管系統。細胞分裂時會形成大量管狀構造，也就是有絲分裂時的線狀構造，在染色體分佈至兩子細胞後這微管系統便進行分解，而完成細胞分裂，Paclitaxel 可抑制微管系統的分解過程，使細胞被"固定"在分裂的過程中而死亡。

二、適應症：晚期卵巢癌、淋巴轉移乳癌、非小細胞肺癌、卡波西氏肉瘤二線療法。

三、副作用：骨髓方面—嗜中性白血球過低症、白血球過低症、血小板過低症、貧血、感染出血、過敏反應、心跳過慢、低血壓、心電圖異常、周邊神經病變、肌肉痛或關節痛、胃腸道方面—噁心及嘔吐、腹瀉、黏膜炎、禿髮、肝功能異常。

四、注意事項：

若有以下症狀，請與您的醫師或護理人員聯絡

- 可能使白血球減少，增加感染的機率，病人應多注意衛生習慣。
- 噁心、嘔吐、掉髮等腸胃副作用常見。
- 觀察自己的身體狀況，若有發燒、呼吸困難、皮膚異常等症狀應盡快與醫師聯絡。

天成醫療社團法人天晟醫院藥劑科
院址：桃園市中壢區延平路 155 號
諮詢專線：03-4629292 轉 22525