天成醫療體系

化療藥品衛教單張（民眾版）
愛斯達好克癌注射劑（**Holoxan**）

外觀	商品名	中文名	學名	規格含量
	Holoxan	愛斯達好克癌注射劑	Ifosfamide	2g/vial

懷孕分級：D（FDA）、D（AUS）
授乳分級：Infant risk cannot be ruled out.

一、作用機轉：. Ifosfamide 是烷基化劑，是 Cyclophosphamide 之衍生物，也在肝臟代謝成活性代謝物，毒性較小一些。本藥與其他抗腫瘤劑併用是子宮頸癌、橫紋肌肉瘤、尤汶氏瘤(Ewing’s tumor)、軟組織肉瘤等之首選用藥。

二、適應症：支氣管癌、睪丸癌、軟組織肉瘤（平滑肌肉瘤、橫紋肌肉瘤、軟骨肉瘤）骨肉瘤、乳癌、子宮內膜癌、腎上腺癌及惡性淋巴癌之緩解。

三、副作用：嗜眠、精神混亂、幻覺、噁心、嘔吐、禿髮、嗜中性白血球減少症，血小板減少症，出血性膀胱炎。

四、**注意事項：**因免疫力降低，可能增加感染的危險。通常白血球會在給藥後 7-14 天之內達到最低，如果有任何感染的症狀如發燒，打顫，喉嚨痛等，請盡速就醫。也會造成血小板減少及貧血的現象，要注意身上是否有小紫斑，或小出血點。可能會較容易感到疲勞。

院址：桃園市中壢區延平路 155 號
諮詢專線：03-4629292 轉 22525