天成醫療體系

化療藥品衛教單張（醫護版）

爾定康靜脈注射液（Carboplatin）

外觀	商品名	中文名	學名	規格含量
	Kemocarb	爾定康靜脈注射液	Carboplatin	10mg/ml;15ml/vial

給藥方式：IVF、IV、
懷孕分級：X（FDA）、D（AUS）
授乳分級：Infant risk cannot be ruled out.

一、作用機轉：

Carboplatin resembles an alkylating agent. Although the exact mechanism of action is unknown, action is thought to be similar to that of the bifunctional alkylating agents, that is, possible cross-linking and interference with the function of DNA . It is cell cycle–phase nonspecific

二、原液保存條件：室溫避光存放。

三、配製及保存期限：配製後，室溫可存放 8 小時（冷藏 24 小時）。

四、稀釋及保存期限：可以 NS、D_5W 稀釋，室溫可保存 8 小時

五、其他注意事項：

1. 鋁會與 carboplatin 反應而形成沉澱，並使力價喪失。因此，製備或給予 Kemocarb 時，不可以使用含鋁針頭，或可能與藥品接觸部位含鋁的靜脈給藥器組。
2. 冷藏 24 小時。
3. Carboplatin 注射液禁用於曾對 cisplatin、其他含鉑化合物、或 mannitol 產生嚴重過敏反應。