


Tiotropium (Spiriva Respimat)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

1



構造說明

- 請詳閱左邊說明及代碼

2



裝填藥罐

- 按住安全扣(E)，按下透明底座(G)。

3



推入藥罐

- 將藥罐(H)推進吸入器底部，直到發出【卡嗒】聲。也可以放在桌面上將藥罐輕壓裝入。

4



裝填完成

- 把透明底座(G)裝回去就完成了。



1

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-165-04



Tiotropium (Spiriva Respimat)

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

1



使用說明：轉

- 將透明底座按照紅色箭頭方向旋轉，轉半圈會有【卡嗒】一聲。

2



使用說明：開

- 打開綠色蓋子。

3



使用說明：吸

- 含住口含器，按下給藥鈕並同時慢慢地深吸氣，吸大約2秒鐘。

4



使用說明：閉

- 吸完後儘量閉氣約10秒鐘，然後就可以恢復呼吸完成吸藥了。

2



T-C-0210-ED-165-04



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

Tiotropium

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於治療慢性阻塞性肺病 (COPD)。
2. 此藥的作用是治療氣喘。
3. 此藥不用於治療急性發作的呼吸短促。使用急救吸入型藥物。請和醫師討論。

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動，直到您發現該藥的影響。
2. 若您的呼吸問題惡化、急救吸藥器沒有發揮作用或需要使用急救吸藥器的頻率提高，請立即聯絡您的醫師。
3. 請勿讓此藥進入您的眼睛。如果進入您眼睛，可能導致瞳孔放大和視力模糊。
4. 用藥量不可超過醫師指示的劑量。用藥頻率或用藥時間不可超過指示。若有上述情形，可能會使出現嚴重副作用的機率增大。
5. 若你是 65 歲或 65 歲以上，使用此藥時要小心。你可能會較多的副作用。
6. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。



Tiotropium

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：口乾、噁心、鼻或咽喉刺激、流鼻涕或鼻塞、咳嗽、胃痛、眩暈。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 若您直到第二天才想起錯過一次用藥，則跳過該次錯過的用藥量（不再補服），之後回到正常用藥時間。
3. 每日使用此藥物勿超過1次。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 所有劑型：
 - a. 存放於室溫下。
 - b. 儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
 - c. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
 - d. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥劑師諮詢。您所在地區可能有藥物回收計劃。

