

# Alfentanil

製定日期：102年9月11日  
修定日期：109年7月1日(第4版)

## 一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於手術麻醉。
2. 此藥用於減輕疼痛。

## 二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 在此藥藥效消失以及您感覺完全清醒前，避免駕駛和進行任何其他要求集中警覺的任務或行動。
2. 為降低頭暈或昏厥的機率，若您已坐下或躺下一段時間，應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。
3. 此藥品內含類鴉片藥物。當將類鴉片藥物與 benzodiazepine 或其他可能讓您昏昏欲睡或動作減慢的藥物結合使用時，會產生嚴重的副作用。這包括呼吸減慢或呼吸困難以及死亡。Benzodiazepine 包括 alprazolam、diazepam 和 lorazepam 之類的藥物。Benzodiazepine 可能用於治療許多健康問題，例如焦慮症、難以入睡或癲癇發作。若您尚有任何疑問，請告知您的醫師。
4. 許多藥物與此藥產生交互反應，並且會提高副作用的發生機率，例如致命的呼吸問題。請告知您的醫師或藥劑師，以確保此藥能安全地與所有其他藥物作搭配。
5. 服藥時請勿一併飲酒或服用含酒精成分的產品。可能會出現不安全甚至有時致命的作用。



1

Last Reviewed Date  
2020-03-03 UpToDate



T-C-0210-ED-121-04



# Alfentanil

製定日期：102年9月11日  
修定日期：109年7月1日(第4版)

## 二. 使用此藥必須注意哪些事項？

6. 此藥會提高部分病患癲癇發作的機率，包括過去曾癲癇發作的病患。洽詢您的醫師，以瞭解您在服用此藥期間是否有更高的機率發生癲癇。
7. 若你是 65 歲或 65 歲以上，使用此藥時要小心。你可能會有的副作用。
8. 如果您在懷孕時服用此藥物，可能會傷害腹中胎兒。若在服用此藥期間您懷孕或試圖懷孕，應立即致電醫師商洽。
9. 若懷孕期間長期使用此藥，可能會造成新生兒出現戒斷症狀。這可能會危及生命。請和醫師討論。
10. 若您正以母乳餵養幼兒或計畫以母乳餵養幼兒，請告知醫師。此藥會進入母乳並可能會傷害您的嬰兒。

## 三. 副作用為何？

1. 可能包括：嗜睡、眩暈、噁心或嘔吐、肌肉僵硬。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

## 四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 將會在需要時在醫療保健環境中給予此藥物。

## 五. 我應該如何儲存此藥？

1. 若您需要在家存放此藥，請向醫師、護理師或藥劑師洽詢儲放方式。

