

# Fentanyl

製定日期：102年9月11日  
修定日期：109年7月1日(第4版)

## 一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於減輕疼痛。
2. 該藥於手術中使用。



## 二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 為降低頭暈或昏厥的機率，若您已坐下或躺下一段時間，應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。
3. 在與您的醫生溝通之前，請勿將此藥物與其他強烈止痛藥物一起服用，或者，將此藥物與止痛貼劑一起使用。
4. 用藥量不可超過醫師指示的劑量。用藥頻率或用藥時間不可超過指示。若有上述情形，可能會使出現嚴重副作用的機率增大。
5. 如果您已長時間服用此藥物，或者服用很高的劑量，藥效可能會不佳，您可能必須服用更高的劑量才能得到相同的效果。這就是所謂的耐藥量。如果此藥的藥效降低，請聯絡您的醫師。請勿服用超過醫師指示的劑量。
6. 此藥會提高部分病患癲癇發作的機率，包括過去曾癲癇發作的病患。洽詢您的醫師，以瞭解您在服用此藥期間是否有更高的機率發生癲癇。



# Fentanyl

製定日期：102年9月11日  
修定日期：109年7月1日(第4版)

## 二. 使用此藥必須注意哪些事項？

7. 長期或定期使用類鴉片藥物（如此類藥物）可能會導致藥物依賴性。突然降低劑量或停用此藥可能會增高藥物戒斷或出現其他嚴重問題的風險。降低劑量或停用此藥前，請洽詢您的醫師。您將需要遵照醫師指示。若您疼痛加劇、情緒改變、有自殺的想法或任何其他不良反應，請告知您的醫師。
8. 若你是 65 歲或 65 歲以上，使用此藥時要小心。你可能會較多的副作用。
9. 如果您在懷孕時服用此藥物，可能會傷害腹中胎兒。若在服用此藥期間您懷孕或試圖懷孕，應立即致電醫師商洽。
10. 若您正以母乳餵養幼兒或計畫以母乳餵養幼兒，請告知醫師。此藥會進入母乳並可能會傷害您的嬰兒。



## 三. 副作用為何？

1. 可能包括：便秘、感覺頭暈、想睡、疲倦或虛弱。
2. 臉潮紅、噁心或嘔吐、出汗過多、頭痛、胃痛、口乾。
3. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。



# Fentanyl

製定日期：102年9月11日  
修定日期：109年7月1日(第4版)

## 四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 請致電您的醫師詢問指示。

## 五. 我應該如何儲存此藥？

1. 若您需要在家存放此藥，請向醫師、護理師或藥劑師洽詢儲放方式。

