

Golimumab

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於治療部分類型的關節炎。
2. 該藥用於強直性脊椎炎的治療。
3. 此藥用於治療潰瘍性大腸炎。

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 若您曾患有 B 型肝炎或帶有病毒，此藥可能會導致該病毒再次活躍。這可能會導致嚴重且有時致命的肝臟問題。用藥前將為您進行 B 型肝炎檢驗。您服用此藥時以及停用此藥後數月，將需要觀察肝炎症狀。請洽詢您的醫師。
2. 在施打任何疫苗前，請告知您的醫師。若與一些疫苗同時使用此藥，可能會提高受感染的機會或讓疫苗的效果減弱。
3. 當您使用此藥時，切勿感染削弱的細菌，如膀胱癌卡介苗 (BCG)。請與您的醫師詳細商洽。
4. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。
5. 若您對乳膠過敏，請告知您的醫師。部分產品含有乳膠。
6. 請作皮膚檢查。請告知醫師您是否出現任何皮膚變化症狀，例如出現新的疣、皮膚炎症或者出血或遲遲未癒的紅色腫塊，或痣的顏色或大小改變。

1



T-C-0210-ED-129-04

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate



Golimumab

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

8. 曾經發生使用此藥後出現過敏反應的情形。有些反應可能會非常嚴重或危及生命。因輸注此藥而發生過敏反應時，在大部分的情況下，會在輸注期間或輸注後1小時內發生。若出現任何異常症狀，應立即致電醫師求助。
9. 若你是65歲或65歲以上，使用此藥時要小心。你可能會有的副作用。
10. 此藥尚未獲核准用於18歲以下未成年人。請和醫師討論。
11. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。
12. 若此前您在已經懷孕後曾服用過此藥，應將實情告知您嬰兒的醫師。因為您的孩子遭受感染的機率會更高，至少在其出生後前6個月內。您嬰兒的醫師也將決定應於何時讓嬰兒接受某種疫苗。若讓出生6個月以內的嬰兒接受某些疫苗，可能會引起感染，導致極度嚴重的健康問題甚至致死。



Golimumab

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：用藥處感到刺激、普通感冒徵候。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
3. 若您忘記用藥且不確定該如何做時，請致電聯絡醫師。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 儲存在冰箱內。請勿冷凍儲存。
2. 在原容器中避光保存。
3. 若儲存在室溫下，請備註放在室溫時的日期。
4. 若已將此藥存放於室溫下，請勿再放回冰箱。

