

# Ketamine

製定日期：102年9月11日  
修定日期：109年7月1日(第4版)

## 一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於在手術期間使您入睡。
2. 此藥用於手術麻醉。



## 二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 接受此藥後 1 整天內應避免駕駛車輛或從事其他需提高警覺的工作或活動，直到此藥藥效消失後（安全時才可做上述活動）。
2. 在飲酒或服用其他會造成您行動遲緩的藥物和天然滋補品前，請告知您的醫師。
3. 請遵照指示檢查您的血壓。
4. 服用此藥期間，部分人可能需要接受心臟功能檢測。若您有任何疑問，請諮詢醫師。
5. 曾有人在此藥效消退後出現精神問題。這些問題的範圍可能從心情愉快、夢幻感，到產生幻覺、行為改變，或意識惑亂。通常這些問題會在用藥後持續達 2 個小時，也可能長達 24 個小時。
7. 若你是 65 歲或 65 歲以上，使用此藥時要小心。你可能會會有較多的副作用。
8. 在小動物和孩子身上進行的研究顯示，頻繁或長期使用麻藥或用於治療 3 歲以下孩童睡眠問題的藥物，可能導致長期的大腦疾患。



# Ketamine

製定日期：102年9月11日  
修定日期：109年7月1日(第4版)

## 二. 使用此藥必須注意哪些事項？

9. 用於兒童時須小心。請與醫師商洽相關事項。
10. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。
11. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。您將必須討論對嬰兒造成的風險。



## 三. 副作用為何？

1. 嗜睡。
2. 無饑餓感。
3. 噁心或嘔吐。
4. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

## 四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 需要時即可使用該藥。

## 五. 我應該如何儲存此藥？

1. 若您需要在家存放此藥，請向醫師、護理師或藥劑師洽詢儲放方式。

