

Mepolizumab

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥的作用是治療氣喘。
2. 此藥用於治療嗜酸性肉芽腫性多血管炎 (EGPA)。
3. 請勿用此藥治療氣喘發作。使用急救吸藥器。請告知您的醫師。

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 若您的呼吸問題惡化，應立即致電醫師。
2. 如果您使用急救吸入型藥物並且其藥效不佳或您需要更高的使用頻率，請立即致電醫師。
3. 曾經發生使用此藥後出現過敏反應的情形。大多數情況下，給予此藥後數小時內會發生過敏反應。有時候，過敏反應會在給予此藥後持續數日。
4. 曾經發生使用此藥後出現帶狀皰疹的情形。請洽詢醫師，瞭解使用此藥前是否需要注射疫苗。
5. 一些寄生蟲感染的高風險群，曾在使用此藥後受到寄生蟲感染。醫師可能會進行糞便檢測，以確定您是否受到寄生蟲感染。請與您的醫師洽談。
6. 若您也正在服用口服或吸入式類固醇，請與醫師商洽因應對策。請勿在未告知醫師的情況下停藥。
7. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。



懷孕請告訴醫師



1



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-132-04

Mepolizumab

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：頭痛、背痛、感覺疲倦或虛弱、注射部位發紅和腫脹、應用部位的疼痛或燒灼感、針刺處刺激。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起應儘早服用錯過的藥物，隨後回到您的正常用藥時間。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 儲存在冰箱內。請勿冷凍儲存。
2. 在原容器中避光保存。
3. 防止藥物受熱。
4. 從包裝盒中取出後，請在8小時內使用。若在從包裝盒中取出後8小時內未使用，請丟棄此藥。

