


# Liraglutide (Victoza) 胰妥善注射筆

製定日期：102年9月11日  
修定日期：109年7月1日(第4版)



## 準備

- 在使用注射筆時，請您利用肥皂將手洗淨並拉開筆蓋。




## 準備

- 取入針頭保護片，將針頭筆直且緊密地旋入注射筆。



## 準備

- 取下針頭外蓋並保留下來。



## 準備

- 取下針頭內蓋，並丟棄。



## 排空

- 使用新品前務必檢查排空。
- 旋轉劑量設定鈕，使排空線和指示線對齊。



1

Last Reviewed Date  
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-109-04




# Liraglutide (Victoza) 胰妥善注射筆

製定日期：102年9月11日  
修定日期：109年7月1日(第4版)



## 排空

- 將針頭向上，握住注射筆，以手指輕彈筆管數次，使氣泡聚集於筆管上端。



## 排空

- 保持針頭向上並將**按鈕按到0mg與指示線對齊**。
- 重覆步驟5到7直到針尖端出現液滴。



## 設定劑量

- 設定劑量前，務必確保**0mg與指示線對齊**。
- 旋轉劑量設定鈕至您所需處方劑量與指示線對齊。
- 若不小心選錯**，只需轉至正確劑量與指示線對齊。



設定了  
0.6mg



設定了  
1.2mg



設定了  
1.8mg

Last Rev  
2020-03-0



2

T-C-0210-ED-109-04




# Liraglutide (Victoza) 胰妥善注射筆

製定日期：102年9月11日  
修定日期：109年7月1日(第4版)



## 注射

- 依照醫護人員指示的注射方式將針頭插入皮膚內。
- 壓住按鈕直到0mg與指示線對齊，持續壓到底讓針頭停留於皮膚下至少6~10秒，以確保劑量完整。




## 注射

- 拔出針頭，可能有液體在針頭尖端，不會對剛才注射的劑量有影響。



## 注射

- 小心將針頭外蓋完全蓋回，將針頭旋取下來，丟棄針頭並將筆蓋蓋上。



注射部位如左圖所示

Last Review  
2020-03-03



T-C-0210-ED-109-04

3





# Liraglutide

製定日期：102年9月11日  
修定日期：109年7月1日(第4版)

## 一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥的作用是減低糖尿病患者的血糖含量。
2. 此藥用於減少某些人心臟病發作、中風與死亡的機率。
3. 此藥可協助您減肥。

## 二. 使用此藥必須注意哪些事項？

### 1. 關於此藥所有使用情況：

- a. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
- b. 飲酒前，先洽詢醫師指示。
- c. 曾出現腎臟疾病。有時可能需要住院或透過透析治療腎臟疾病。
- d. 曾出現膽囊問題。有時需要住院接受治療。有時候需要移除膽囊。向醫師洽詢您的任何問題。
- e. 若您無法透過嘴巴喝飲料或感覺胃部不適、嘔吐或持續不斷的腹瀉，您須避免脫水。請聯絡醫師瞭解應如何處理。脫水可能會引發新的腎臟問題或加劇。
- f. 此藥可阻止許多其他口服藥物進入人體。若您使用其他口服藥物，這些藥的使用時間可能必須和此藥錯開。請洽詢您的醫師。
- g. 勿與任何其他人共用注射筆或卡匣，即使已更換針頭。共用這類裝置可能將感染從一人傳染給其他人。這包括您可能並不知道自己已經有的感染。
- i. 某些藥品不適合為兒童病患使用。請洽詢醫師相關事項。
- j. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。您將必須討論對嬰兒造成的風險。



# Liraglutide

製定日期：102年9月11日  
修定日期：109年7月1日(第4版)

## 二、使用此藥必須注意哪些事項？

### 2. 若用於高血糖：

- a. 若您的血糖一直偏低，請勿開車。否則發生意外的危險性會增加。
- b. 請遵照醫師指示檢查您的血糖。
- c. 在經歷發燒、感染、受傷或進行手術等對身體造成負擔的情形時，可能更難以控制血糖。身體活動、運動或餐食改變可能也會影響血糖。

### 3. 若用於減重：

- a. 若您患高血糖（糖尿病），將需密切觀察您的血糖變化。
- b. 若懷孕期間減重可能會傷及腹中胎兒。若您服用此藥物期間懷孕了或您打算懷孕，請立即致電聯絡醫師。

## 三. 副作用為何？

1. 關於此藥所有使用情況：頭痛、腹瀉或便秘、噁心或嘔吐、無饑餓感、針刺處刺激。
2. 若用於高血糖：鼻或咽喉刺激、背痛。
3. 若用於減重：胃痛、感覺疲倦或虛弱。
4. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。



# Liraglutide

製定日期：102年9月11日  
修定日期：109年7月1日(第4版)

## 四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 跳過未服的藥物，繼續按照您的療程服藥。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
3. 若您已有3天忘記服用此藥，請致電詢問醫師指示。

## 五. 我應該如何儲存此藥？

1. 冷藏保存未開封的筆。請勿冷凍。
2. 若已經過冷凍，切勿使用。
3. 室溫保存或冷藏保存開封的筆。請勿冷凍。
4. 開封30天後，須將任何未使用的藥物丟棄。
5. 每次注射後應取下針頭。勿將針頭留在裝置上儲存。
6. 防止藥物受熱及暴露於光線下。
7. 不使用時應將注射筆蓋好。
8. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
9. 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥劑師諮詢。

