

Amlodipine and Benazepril

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於治療高血壓。
2. 此藥可能因其他原因而給您服用。請洽詢您的醫師。

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 可能需要數週才能充分顯現療效。
2. 在您明白該藥物對您的影響之前，
應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
3. 為降低頭暈或昏厥的機率，若您已坐下或躺下一段時間，應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。
4. 若您對 tartrazine (酒石黃) 過敏，請洽詢醫師。
某些藥品含有酒石黃。
5. 請遵照指示檢查您的血壓。
6. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。
7. 若您正在使用含鉀的鹽替代品、
留鉀性利尿劑或鉀補充劑，請告知您的醫師。
8. 若您正接受低鹽或無鹽餐，請告知醫師。
9. 雖然比較罕見，但在初次使用此藥或增大此藥劑量時，可能出現胸痛加劇和心臟病發作風險。



Amlodipine and Benazepril

製定日期：102年9月11日

修定日期：109年7月1日(第4版)

10. 已有接受 captopril (卡特普) (一種與此藥相似的藥物) 後引起白血球計數偏低的病例發生。這會導致受感染的風險升高。大多數情況下，患有腎臟疾病的病患，特別是同時患有其他一些特定健康問題的病患，發生感染的機率更高。若您出現感染徵候，例如發燒、發冷或喉嚨痛，請立即致電聯絡您的醫師。
11. 使用可能升高血壓的非處方藥前請洽詢醫師。這包括咳嗽或感冒藥、減肥藥、興奮劑、布洛芬或類似的藥品、某種天然製品或補充劑。
12. 飲酒前，先洽詢醫師指示。
13. 於高熱天氣或動態活動時，請務必小心。喝大量的水以防止脫水。
14. 若您過度排汗、體液流失、嘔吐或稀便，請告知您的醫師。這可能會導致低血壓。
15. 曾經發生稱作血管性水腫的嚴重且有時致命的反應。黑人病患出現血管性水腫的機率可能較高。
16. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。您將必須討論對嬰兒造成的風險。



Amlodipine and Benazepril

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：眩暈、咳嗽。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 若漏服藥物12小時或更長時間，則跳過漏服的劑量，仍然按正常時間表服藥。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

