

# Clindamycin (Systemic)

製定日期：102年9月11日  
修定日期：109年7月1日(第4版)

## 一. 此藥有哪些作用？


1. 此藥用於治療或預防細菌感染。

## 二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 若您使用此藥已有較長時間，請做血液檢驗。請洽詢醫師。

2. 此藥不治療一般感冒。

3. 請勿持續服用超過指示期間。  
可能會發生二次感染。



5. 若您對 tartrazine (酒石黃) 過敏，請洽詢醫師。某些藥品含有酒石黃。



6. 曾經發生嚴重且有時致命的反應。多數情形下，這類不良反應包括（例如）發燒樣徵候、皮疹或腺體腫大，並伴發身體多處器官（如肝臟、腎臟、血液、心臟、肌肉及關節或肺部）疾患。若您有任何疑問，請告知醫師。

7. 若您已 60 歲或以上，使用此藥時須小心。您可能會出現更多副作用。

8. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。



# Clindamycin (Systemic)

製定日期：102年9月11日  
修定日期：109年7月1日(第4版)

## 三. 副作用為何？

1. 可能發生胃痛或腹瀉、噁心或嘔吐、味覺異常。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

## 四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

## 五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。請勿冷存或冷凍。
2. 儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

