

Famotidine


製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用？

1. 此藥用於治療或預防胃腸道潰瘍。
2. 此藥用於治療胃食道逆流疾病 (gastroesophageal reflux disease) (GERD；胃酸逆流)。
3. 此藥用於治療胃灼熱和胃酸過多。
4. 此藥用於治療胃酸過多引起的症候群。
5. 此藥可能因其他原因而給您服用。請洽詢您的醫師。

二. 使用此藥必須注意哪些事項？

1. 若您有腎臟問題或年長，請告知您的醫師。有腎臟問題的病患和年長病患曾經出現過幻覺（看見或聽見不存在的事物）；癲癇發作；以及感到易怒、困惑、遲鈍或不適。
2. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。
3. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。您將必須討論對嬰兒造成的風險。



Famotidine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：頭痛、腹瀉、頭暈、便秘。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 假如您定期服用此藥物，錯過服用時請在想起時立即服用。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
4. 該藥可使用數次，需要時即可使用。服用次數勿超過醫師囑咐的次數。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 儲存在乾燥處。不要儲存在浴室
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

