

Omeprazole

★ 「Omeprazole」：

Omeprazole 用於治療胃潰瘍、胃食道逆流，胃部胃酸過多如 Zollinger-Ellison，也用在和其他藥併，用來治療幽門螺旋桿菌造成的胃

潰瘍，此藥是屬於 PPI 類藥物，可以抑制胃部胃酸分泌。

★ 如何服用本品？

1.Omeprazole 為一種緩釋劑型的口服錠劑，一天 1 次於早餐前服用，如和其他藥物併用來治療幽門螺旋桿菌所造成的胃潰瘍時，可以一天 1~3 次，請依照醫師指示之時間服用，不可擅自增加或減少劑量；亦不可擅自停藥。

2.Omeprazole 為緩釋劑型，因此勿將此藥咬碎，如您無法吞藥可將

Omeprazole 加入果汁、蘋果醬或非碳酸類的水中後服用。

3.如您覺得症況好轉，也須持續服用，不可以在未告知醫師情況下擅自停藥。

★ 是否有其他用途？

Omeprazole 亦可用於治療喉嚨發炎，詳細情形請詢問您的醫師。此藥也可用於其他適應症，詳細的情形請詢問醫師或藥師以得到更多資訊。

★ 注意事項：在服用 Omeprazole 前，

1.如有 omeprazole 或其他藥物過敏，請主動告知您的醫師和藥師。

2.如有服用其他處方藥或者非處方藥、維他命、營養補充品和中藥，需告知您的醫師或藥師。

3.並請再次確認，若您恰好有服用以下藥品，請主動告知醫師：
ampicillin；抗凝血劑 warfarin；cyclosporine；diazepam；
disulfiram；ketoconazole；焦慮症藥物；抗癲癇藥

phenytoin；鎮靜劑；安眠藥，醫師可能會為您調整劑量，並密切觀察您的情況以避免副作用發生。

4.如果您有肝臟方面的疾病，請主動告知您的醫師。

5.如果您服用此藥時有計畫要懷孕、已懷孕、或者要哺乳，請和您的醫師聯絡。



★ 服藥期間，飲食注意事項？

如您的醫師無特別交代，請依照您正常的飲食方式即可。

★ 忘記服藥時，該怎麼辦？儘快在您想起的當下補服，如距離下次服藥時間非常接近，請跳過此劑量，直接按照原先的服藥時間服用下個劑量即可，切記！請勿因忘記服藥而一次服兩個劑量。

★ 可能產生的副作用：

包括：上胃部疼痛、腹瀉、頭暈、紅疹、咳嗽、便秘等。

★ 如何貯存？

將此藥存放在可蓋緊的容器，並遠離兒童可取得的地方。將此藥存放在室溫下且遠離熱源和潮濕。

★ 如果我服藥超過劑量怎麼辦？

如果服用過量，請盡速就醫，倘若病人已出現昏迷或者停止呼吸請立即叫救護車就醫。服藥過量所導致的症狀如下：意識混亂、嗜睡、視力模糊、心跳過速或不規則、胃部不適、出汗、口乾、頭痛等。

此用藥指導卡並未包含本藥所有的藥品資訊，
若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師
製定日期：102.9.11 修定日期：107.5.1(第三版)