

# 天成醫療體系

## Ten-Chen Medical Group

避免與中草藥併服的藥品一覽表：

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
大黃	Captopril	Ceropin 25mg/Tab	中藥與西藥產生協同作用	作用加成	調整劑量
大黃	Methotrexate	Methotrexate 2.5mg/Tab	中藥使西藥無法從細胞內外排	西藥累積在細胞	避免併用
大黃	Nifedipine	Atanaal 5mg/Cap、 Nedipin 10mg/Tab、 Nifedipine 30mg/Tab	中藥與西藥產生協同作用	作用加成	調整劑量
大黃	Adenosine	Adenozer 6mg/2mL/Vial	與西藥產生結合反應	喪失療效	隔開使用
大黃	Aluminum hydroxide	Aluminum hydroxide dried gel 300mg/Tab	中藥含Tannin 與西藥產生結合反應	喪失療效	隔開使用
大黃	Amiodarone HCl	Cordarone 150mg/3ml/Amp Cordarone 200mg/Tab	與西藥產生結合反應	喪失療效	隔開使用
大黃	Amlodipine+Atorvastatin	Caduet	中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
大黃	Atorvastatin	Lipitor 10mg/Tab Lipitor 20mg/Tab	中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
大黃	Bisacodyl	Dulcolax 5mg/Tab	與西藥產生結合反應	喪失療效	隔開使用
大黃	Chloramphenicol		西藥使腸內菌失衡，大黃失去致瀉作用；Tannin 使西藥生沉澱，不易吸收。	中西藥療效皆降低	避免併用
大黃	Cholestyramine		中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
大黃	Cyclosporin		中藥降低Cyclosporine 之AUC	西藥療效降低	隔開使用
大黃	Detemir Insulin	Levemir 300U/3ml/Penfill	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
大黃	Digoxin	Lanoxin 0.25mg/Tab Lanoxin 0.5mg/2mL/Amp	降低Digoxin 療效	西藥療效降低	隔開使用
大黃	Erythromycin estolate		Tannin 使西藥生沉澱，不易吸收。	西藥療效降低	隔開使用
大黃	Erythromycin ethylsuccinate		Tannin 使西藥生沉澱，不易吸收。	西藥療效降低	隔開使用

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
大黃	Ezetimibe+ Simvastatin	Vytorin	中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
大黃	Fenofibrate	Lipanthyl 160mg/Tab	中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
大黃	Fluvastatin	Lescol XL 80mg/Tab	中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
大黃	Furosemide	Rosis 40mg/Tab Rosis 20mg/2mL/Amp	與西藥產生結合反應	喪失療效	隔開使用
大黃	Gemfibrozil		中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
大黃	Glibenclamide	Gliben 5mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
大黃	Glimepiride	Grumed 2mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
大黃	Indapamide	Nakamide 2.5mg/Tab	與西藥產生結合反應	喪失療效	隔開使用
大黃	Insulin Aspart	NovoRapid 300U/3ml/Penfill	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
大黃	Insulin Glargine	Lantus 300U/3ml/Penfill	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
大黃	Isophane insulin Human		中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
大黃	Lactulose	Lactul 666mg/ml 60ml/bot	與西藥產生結合反應	喪失療效	隔開使用
大黃	Lidocaine	Lignocaine 2% 100mg/5ml/Amp Xylocaine 2% 400mg/20ml/Vial	與西藥產生結合反應	喪失療效	隔開使用
大黃	Magnesium Oxide	MgO 250mg/Tab	中藥含Tannin 與西藥產生結合反應	喪失療效	隔開使用
大黃	Metformin	Glucophage 500mg/Tab Amaryl M Tab Galvus Met Tab Janumet Tab Kombiglyze XR Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
大黃	Mexiletine	Mexitol 100mg/Cap	與西藥產生結合反應	喪失療效	隔開使用
大黃	Phosphate Sodium	Evac enema 118mL/Bot	與西藥產生結合反應	喪失療效	隔開使用
大黃	Pioglitazone	Actos 30mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
大黃	Premixed Insulin	NovoMix 30 300U/3ml/Penfill Humalog 25 300U/3ml/Penfill Humalog 50 300U/3ml/Penfill	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
大黃	Propafenone	Rytmonorm 150mg/Tab	與西藥產生結合反應	喪失療效	隔開使用
大黃	Quinidine		與西藥產生結合反應	喪失療效	隔開使用
大黃	Regular Insulin human	Insulin Actrapid HM 10mL/Vial	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
大黃	Repaglinid	NovoNorm 1mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
大黃	Riboflavin	DailyCare Actibest/Tab B-Complex Tab Combeplex 1ml/amp	Vitamine B2 在鹼性中不安定	口服西藥效果降低	避免併用
大黃	Rifampin	Rifampin 150mg/Cap Rifater S.C.Tab Rifinah 150/Tab Rifinah 300/Tab	Tannin 使西藥生沉澱，不易吸收。	西藥療效降低	隔開使用
大黃	Rosuvastatin	Crestor 10mg/Tab Robestar 10mg/Tab	中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
大黃	Sitagliptin	Januvia 100mg/Tab Janumet Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
大黃	Sodium Bicarbonate	Sod. Bicarbonate 600mg/Tab Rolikan 70mg/ml 20ml/Amp	中藥含Tannin 與西藥產生結合反應	喪失療效	隔開使用
大黃	Spirolactone	Spirotone 25mg/Tab	與西藥產生結合反應	喪失療效	隔開使用
大黃	Tetracycline		Tannin 使西藥生沉澱，不易吸收。鹼性環境下西藥溶解度降低。	西藥療效降低	隔開使用
大黃	Trichlormethiazide	Fluitran 2mg/Tab	與西藥產生結合反應	喪失療效	隔開使用
大黃	Warfarin sodium	Mafarin 5mg/Tab	降低warfarin療效	西藥療效降低	隔開使用
三黃瀉心湯	Methotrexate	Methotrexate 2.5mg/Tab	中藥使西藥無法從細胞內外排	西藥累積在細胞	避免併用
三黃瀉心湯	Oxacillin	Oxacillin 1g/vial	具有協同作用	作用加成	調低劑量
山楂	Digoxin	Lanoxin 0.25mg/Tab Lanoxin 0.5mg/2mL/Amp	中藥可能增強西藥療效	作用加成	追蹤情況
山楂	Levodopa	Bendopar 125mg/Cap Madopar 250mg/Tab	中藥抑制西藥代謝	可能引起高血壓	監測血壓
山楂	降血壓藥物		中藥可能加成降壓效果	作用加成	監測血壓

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
川芎茶調散	Midazolam	Midazo 15mg/3ml/amp Midatin 5mg/ml/amp	中藥可能抑制西藥代謝	作用加成	觀察狀況
木瓜	Warfarin	Mafarin 5mg/Tab	中藥可能增強西藥療效	作用加成	監測INR、留意出血狀況
加味道遙散	Midazolam	Midazo 15mg/3ml/amp Midatin 5mg/ml/amp	中藥可能增加西藥代謝	西藥療效降低	觀察狀況
半夏瀉心湯	Midazolam	Midazo 15mg/3ml/amp Midatin 5mg/ml/amp	中藥可能增加西藥代謝	西藥療效降低	觀察狀況
正骨紫金丹	Midazolam	Midazo 15mg/3ml/amp Midatin 5mg/ml/amp	中藥可能抑制西藥代謝	作用加成	觀察狀況
甘露飲	Midazolam	Midazo 15mg/3ml/amp Midatin 5mg/ml/amp	中藥可能增強西藥療效	作用加成	觀察狀況
甘露飲	Warfarin	Mafarin 5mg/Tab	中藥可能增強西藥療效	作用加成	追蹤情況
西洋參	Warfarin	Mafarin 5mg/Tab	中藥減少西藥的抗凝血效果	西藥療效降低	監測INR、留意血栓狀況
西洋參	降血糖藥物		中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
辛夷清肺湯	Midazolam	Midazo 15mg/3ml/amp Midatin 5mg/ml/amp	中藥可能抑制西藥代謝	作用加成	觀察狀況
清心蓮子飲	降血糖藥物		中藥致降血糖作用下降	西藥療效降低	調整劑量
疏經活血湯	Acetaminophen	Depyretin 500mg/tab	中藥加強西藥的肝毒性	西藥副作用增加	避免併用
疏經活血湯	Warfarin	Mafarin 5mg/Tab	中藥加強西藥的抗凝血作用	西藥療效增加	監測INR、留意出血狀況
生脈飲	Warfarin	Mafarin 5mg/Tab	中藥加強西藥的抗凝血作用	西藥療效增加	監測INR、留意出血狀況
麥門冬湯	Aminophylline	Aminophyllinae 100mg/Tab	中藥增加西藥作用時間及最高濃度	西藥療效增加	隔開使用
麥門冬湯	Theophylline	Thoin 125mg/Cap	中藥增加西藥作用時間及最高濃度	西藥療效增加	隔開使用
補陽還五湯	Aspirin	Bokey 100mg/Cap	中藥可能增加西藥的作用	西藥療效增加	觀察狀況
人參養榮湯	Aspirin	Bokey 100mg/Cap	中藥可能減少西藥的作用	西藥療效降低	觀察狀況

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
桂枝湯	Aspirin	Bokey 100mg/Cap	中藥可能減少西藥的作用	西藥療效降低	觀察狀況
上中下通用痛風丸	Aspirin	Bokey 100mg/Cap	中藥可能增加西藥的作用	西藥療效增加	觀察狀況
溫經湯	Ibuprofen	Purfen 400mg/Tab	中藥可能減少西藥的作用	西藥療效降低	觀察狀況
川紅花	Ezetimibe+ Simvastatin	Vytorin	中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
川紅花	Fenofibrate	Lipanthyl 160mg/Tab	中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
川紅花	Fluvastatin	Lescol XL 80mg/Tab	中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
川紅花	Gemfibrozil		中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
川紅花	Rosuvastatin	Crestor 10mg/Tab Robestar 10mg/Tab	中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
丹參	Acarbose	Glucobay 100mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
丹參	Acetyl-salicylic acid	Bokey 100mg/Cap	使Aspirin 蛋白結合率減少	西藥療效增加	隔開使用
丹參	Acipimox		中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
丹參	Amlodipine+Atorvastatin	Caduet	中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
丹參	Atorvastatin	Lipitor 10mg/Tab Lipitor 20mg/Tab	中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
丹參	Calcium carbonate	Gaining 500mg/Tab	產生結合反應	降低療效	隔開使用
丹參	Cholestyramine		中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
丹參	Detemir Insulin	Levemir 300U/3ml/Penfill	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
丹參	Digoxin	Lanoxin 0.25mg/Tab Lanoxin 0.5mg/2mL/Amp	未明	西藥療效增加	隔開使用
丹參	Enoxaparin sodium	Clexane 60mg/6000U/0.6ml/syringe	丹參具活血化瘀作用	作用加成	隔開使用
丹參	Ezetimibe+ Simvastatin	Vytorin	中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
丹參	Fenofibrate	Lipanthyl 160mg/Tab	中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
丹參	Fluvastatin	Lescol XL 80mg/Tab	中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
丹參	Gemfibrozil		中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
丹參	Glibenclamide	Gliben 5mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
丹參	Glimepiride	Grumed 2mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
丹參	Insulin Aspart	NovoRapid 300U/3ml/Penfill	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
丹參	Insulin Glargine	Lantus 300U/3ml/Penfill	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
丹參	Isophane insulin Human		中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
丹參	Magnesium Oxide	MgO 250mg/Tab	產生結合反應	降低療效	隔開使用
丹參	Metformin	Glucophage 500mg/Tab Amaryl M Tab Galvus Met Tab Janumet Tab Kombiglyze XR Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
丹參	Phenobarbital sodium	Phenobarbital 30mg/Tab	未明	鎮靜作用增加	隔開使用
丹參	Pioglitazone	Actos 30mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
丹參	Premixed Insulin	NovoMix 30 300U/3ml/Penfill Humalog 25 300U/3ml/Penfill Humalog 50 300U/3ml/Penfill	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
丹參	Regular Insulin human	Insulin Actrapid HM 10mL/Vial	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
丹參	Repaglinid	NovoNorm 1mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
丹參	Rosuvastatin	Crestor 10mg/Tab Robestar 10mg/Tab	中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
丹參	Sitagliptin	Januvia 100mg/Tab Janumet Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
丹參	Warfarin sodium	Mafarin 5mg/Tab	增加INR，增加PT/PTT。	丹參降低Warfarin的排除(加重Warfarin的出血作用)	避免併用
甘草	Aspirin	Bokey 100mg/Cap	胃酸，胃蛋白的分泌增加，刺激胃黏膜。	加重潰瘍，甚至引起上消化道出血。	避免併用
甘草	Cyclosporin	Adenozer 6mg/2mL/Vial	甘草易使鉀離子流失	西藥副作用增加	避免併用
甘草	Amiodarone HCl	Cordarone 150mg/3ml/Amp Cordarone 200mg/Tab	甘草易使鉀離子流失	西藥副作用增加	避免併用
甘草	Bisacodyl	Dulcolax 5mg/Tab	甘草易使鉀離子流失	西藥副作用增加	避免併用

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
甘草、複方甘草片	<b>Digoxin</b>	<b>Lanoxin 0.25mg/Tab Lanoxin 0.5mg/2mL/Amp</b>	甘草易使鉀離子流失	西藥在低血鉀下易產生毒性	避免併用
甘草	<b>Estradiol valerate</b>		中藥含雌性素，與西藥具加成作用	雌激素作用加強	調整劑量
甘草	<b>Estrogen conjugated</b>	<b>Estromon conjugated 0.625mg/Tab Estradiol/MedroxyPROGESTERONE Rone : Indivina、Divina、Covina</b>	中藥具類Estrogen 作用	作用加成	調整劑量
甘草	<b>Hydrocortisone sodium succinate</b>	<b>Hydrocortisone 100mg/Vial</b>	Glycyrrhizin 會抑制 $5\alpha$ 、 $\beta$ reductase、 $11\beta$ dehydrogenase，減少西藥代謝。	造成納水滯留之水腫，血壓控制不良。	避免併用
甘草	<b>Indapamide</b>	<b>Nakamide 2.5mg/Tab</b>	中藥會產生低血鉀，並拮抗利尿劑作用	作用減弱	調整劑量
甘草	<b>Lactulose</b>	<b>Lactul 666mg/ml 60ml/bot</b>	甘草易使鉀離子流失	西藥副作用增加	避免併用
甘草	<b>Methylprednisolone sodium succinate</b>	<b>Medason 40mg/Vial</b>	Glycyrrhizin 會抑制 $5\alpha$ 、 $\beta$ reductase、 $11\beta$ dehydrogenase，減少西藥代謝。	造成納水滯留之水腫。	避免併用
甘草	<b>Mexiletine</b>	<b>Mexitil 100mg/Cap</b>	甘草易使鉀離子流失	西藥副作用增加	避免併用
甘草	<b>Moclobemide</b>		中藥含擬交感神經作用的胺類	造成高血壓危象	避免併用
甘草	<b>Phenobarbital sodium</b>	<b>Phenobarbital 30mg/Tab</b>	兩者皆為肝臟酵素誘導劑，使西藥代謝加速	西藥療效降低	避免併用或調整劑量
甘草	<b>Phosphate sodium</b>	<b>Evac enema 118mL/Bot</b>	甘草易使鉀離子流失	西藥副作用增加	避免併用
甘草	<b>Prednisolone 5mg</b>	<b>Predonine 5mg/Tab</b>	Glycyrrhizin 會抑制 $5\alpha$ 、 $\beta$ reductase、 $11\beta$ dehydrogenase，減少西藥代謝。	造成納水滯留之水腫。	避免併用
甘草	<b>Progesterone micronized</b>	<b>Utrogestan 100mg/Cap</b>	增加西藥對Glycyrrhizin 的敏感度，女比男更敏感	造成水腫，高血壓，低血鉀。	避免併用
甘草	<b>Propafenone</b>	<b>Rytmonorm 150mg/Tab</b>	甘草易使鉀離子流失	西藥副作用增加	避免併用
甘草	<b>Spirolactone</b>	<b>Spirotone 25mg/Tab</b>	中藥會拮抗利尿劑作用	作用減弱	調整劑量
甘草	<b>Trichlormethiazide</b>	<b>Fluitran 2mg/Tab</b>	中藥會產生低血鉀，並拮抗利尿劑作用	作用減弱	調整劑量或避免併用

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
西洋參	<b>Acarbose</b>	<b>Glucobay 100mg/Tab</b>	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
西洋參	<b>Acetyl-salicylic acid</b>	<b>Bokey 100mg/Cap.</b>	中藥會降低西藥的效力	西藥作用減少	調整劑量
西洋參	<b>Alprazolam</b>	<b>Alpraline 0.25mg/Tab</b>	中藥含Panaquilon 能鎮靜CNS	鎮靜作用加成	調整劑量
西洋參	<b>Betamethasone 0.5mg</b>		未明	作用加成	調整劑量
西洋參	<b>Cilostazol</b>	<b>Citazol 50mg/Tab</b>	中藥會降低西藥的效力	西藥作用減少	調整劑量
西洋參	<b>Clopidogrel 75mg</b>	<b>Plavix 75mg/Tab Clopidogrel 75mg/Tab</b>	中藥會降低西藥的效力	西藥作用減少	調整劑量
西洋參	<b>Cortisone acetate</b>		未明	作用加成	調整劑量
西洋參	<b>Detemir Insulin</b>	<b>Levemir 300U/3ml/Penfill</b>	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
西洋參	<b>Dexamethasone</b>	<b>Dexamethasone 0.5mg/Tab Methasone 5mg/Amp</b>	未明	作用加成	調整劑量
西洋參	<b>Diazepam</b>	<b>Vanconin 2mg/Tab DizePAM 10mg/2ml/Amp</b>	中藥含Panaquilon 能鎮靜CNS	鎮靜作用加成	調整劑量
西洋參	<b>Digoxin</b>	<b>Lanoxin 0.25mg/Tab Lanoxin 0.5mg/2mL/Amp</b>	中藥會增加西藥的血中濃度，並可能影響其檢測	西藥作用增強	監控TPR，EKG
西洋參	<b>Dipyridamole</b>	<b>Dipyridamole 75mg/Tab Sancin 50mg/Tab</b>	中藥會降低西藥的效力	西藥作用減少	調整劑量
西洋參	<b>Estradiol valerate</b>		中藥含雌性素，與西藥具加成作用	雌激素作用加強	調整劑量
西洋參	<b>Estrogen conjugated</b>	<b>Estromon conjugated 0.625mg/Tab Estradiol/MedroxyPROGESTE Rone：Indivina、Divina、 Covina</b>	中藥也含西藥類似成分	作用加成	調整劑量
西洋參	<b>Fludrocortisone Acetate</b>		未明	作用加成	調整劑量
西洋參	<b>Furosemide</b>	<b>Rosis 40mg/Tab Rosis 20mg/2mL/Amp</b>	中藥會降低利尿劑的效果	西藥作用減少	調整劑量
西洋參	<b>Glibenclamide</b>	<b>Gliben 5mg/Tab</b>	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
西洋參	<b>Glimepiride</b>	<b>Grumed 2mg/Tab</b>	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
西洋參	<b>Hydrocortisone sodium succinate</b>	<b>Hydrocortisone 100mg/Vial</b>	未明	作用加成	調整劑量
西洋參	<b>Insulin Aspart</b>	<b>NovoRapid 300U/3ml/Penfill</b>	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
西洋參	Insulin Glargine	Lantus 300U/3ml/Penfill	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
西洋參	Isophane insulin Human		中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
西洋參	Lorazepam	Anxicam 2mg/mL/Amp Ativan 0.5mg/Tan	中藥含Panaquilon 能鎮靜CNS	鎮靜作用加成	調整劑量
西洋參	Metformin	Glucophage 500mg/Tab Amaryl M Tab Galvus Met Tab Janumet Tab Kombiglyze XR Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
西洋參	Methylprednisolone sodium succinate	Medason 40mg/Vial	未明	作用加成	調整劑量
西洋參	Moclobemide 150mg		可能是MAOI 和SSRI 併用的關係	頭痛震顫視幻覺	調整劑量
西洋參	Phenobarbital	Phenobarbital 30mg/Tab	中藥具CNS 抑制作用。	中樞神經抑制作用加成	調整劑量
西洋參	Pioglitazone	Actos 30mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
西洋參	Premixed Insulin	NovoMix 30 300U/3ml/Penfill Humalog 25 300U/3ml/Penfill Humalog 50 300U/3ml/Penfill	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
西洋參	Regular Insulin human	Insulin Actrapid HM 10mL/Vial	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
西洋參	Repaglinid	NovoNorm 1mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
西洋參	Sitagliptin	Januvia 100mg/Tab Janumet Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
西洋參	Warfarin sodium	Mafarin 5mg/Tab	中藥會降低西藥的INR 到1.5，Cmax，AUC。	西藥作用減少	調整劑量
刺五加	Digoxin	Lanoxin 0.5mg/2mL/Amp	造成體內Digoxin 濃度上升	增強Digoxin 藥效	避免併用
刺五加	Regular Insulin human	Insulin Actrapid HM 10mL/Vial	未明	使Insulin 作用增加	MONITOR 血糖
刺五加	Warfarin sodium	Mafarin 5mg/Tab	未明	影響INR 及PT	併用時須特別注意

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
東洋參	Acipimox		中藥含Ginsenoside Rb2，促進肝膽固醇分泌排除。	作用加成	調整劑量
東洋參	Atorvastatin	Lipitor 10mg/Tab Lipitor 20mg/Tab	中藥含Ginsenoside Rb2，促進肝膽固醇分泌排除。	作用加成	調整劑量
東洋參	Detemir Insulin	Levemir 300U/3ml/Penfill	中藥含Ginsenoside	增強Insulin 作用，降血糖。	monitor 血糖
東洋參	Ezetimibe+ Simvastatin	Vytorin	中藥含Ginsenoside Rb2，促進肝膽固醇分泌排除。	作用加成	調整劑量
東洋參	Fluvastatin	Lescol XL 80mg/Tab	中藥含Ginsenoside Rb2，促進肝膽固醇分泌排除。	作用加成	調整劑量
東洋參	Gemfibrozil		中藥含Ginsenoside Rb2，促進肝膽固醇分泌排除。	作用加成	調整劑量
東洋參	Insulin Aspart	NovoRapid 300U/3ml/Penfill	中藥含Ginsenoside	增強Insulin 作用，降血糖。	monitor 血糖
東洋參	Moclobemide 150mg		可能是MAOI 和SSRI 併用的關係	頭痛震顫視幻覺	避免併用
東洋參	Phenobarbital sodium	Phenobarbital 30mg/Tab	人參使用9-30g 時具CNS 抑制作用，兩者作用加成。	抑制呼吸中樞，危及生命。	避免併用
東洋參	Premixed Insulin	NovoMix 30 300U/3ml/Penfill Humalog 25 300U/3ml/Penfill Humalog 50 300U/3ml/Penfill	中藥含Ginsenoside	增強Insulin 作用，降血糖。	monitor 血糖
東洋參	Repaglinid	NovoNorm 1mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
炙甘草	Acetyl-salicylic acid	Bokey 100mg/Cap	胃酸，胃蛋白的分泌增加，刺激胃黏膜。	加重潰瘍，甚至引起上消化道出血。	避免併用
炙甘草	Adenosine	Adenozer 6mg/2mL/Vial	甘草易使鉀離子流失	西藥副作用增加	避免併用
炙甘草	Amiodarone HCl	Cordarone 150mg/3ml/Amp Cordarone 200mg/Tab	甘草易使鉀離子流失	西藥副作用增加	避免併用
炙甘草	Bisacodyl	Dulcolax 5mg/Tab	甘草易使鉀離子流失	西藥副作用增加	避免併用

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
炙甘草	Digoxin	Lanoxin 0.25mg/Tab Lanoxin 0.5mg/2mL/Amp	甘草易使鉀離子流失	西藥在低血鉀下易產生毒性	避免併用
炙甘草	Estradiol valerate		中藥含雌性素，與西藥具加成作用	雌激素作用加強	調整劑量
炙甘草	Estrogen conjugated	Estromon conjugated 0.625mg/Tab Estradiol/MedroxyPROGESTE Rone : Indivina、Divina、 Covina	中藥具類Estrogen 作用	作用加成	調整劑量
炙甘草	Hydrocortisone sodium succinate	Hydrocortisone 100mg/Vial	Glycyrrhizin 會抑制 5 $\alpha$ 、 $\beta$ reductase、11 $\beta$ dehydrogenase ，減少西藥代謝。	造成納水滯留之水腫 ，血壓控制不良。	避免併用
炙甘草	Indapamide	Nakamide 2.5mg/Tab	中藥會產生低血鉀，並拮抗利尿劑作用	作用減弱	調整劑量
炙甘草	Lactulose	Lactul 666mg/ml 60ml/bot	甘草易使鉀離子流失	西藥副作用增加	避免併用
炙甘草	Methylprednisolone sodium succinate	Medason 40mg/Vial	Glycyrrhizin 會抑制 5 $\alpha$ 、 $\beta$ reductase、11 $\beta$ dehydrogenase ，減少西藥代謝。	造成納水滯留之水腫。	避免併用
炙甘草	Mexiletine	Mexitil 100mg/Cap	甘草易使鉀離子流失	西藥副作用增加	避免併用
炙甘草	Moclobemide 150mg		中藥含擬交感神經作用的胺類	造成高血壓危象	避免併用
炙甘草	Phenobarbital	Phenobarbital 30mg/Tab	兩者皆為肝臟酵素誘導劑，使西藥代謝加速	西藥療效降低	避免併用或調整劑量
炙甘草	Phosphate sodium	Evac enema 118mL/Bot	甘草易使鉀離子流失	西藥副作用增加	避免併用
炙甘草	Prednisolone 5mg	Predonine 5mg/Tab	Glycyrrhizin 會抑制 5 $\alpha$ 、 $\beta$ reductase、11 $\beta$ dehydrogenase ，減少西藥代謝。	造成納水滯留之水腫。	避免併用
炙甘草	Progesterone micronized	Utrogestan 100mg/Cap	增加西藥對Glycyrrhizin 的敏感度，女比男更敏感	造成水腫，高血壓， 低血鉀。	避免併用
炙甘草	Propafenone	Rytmonorm 150mg/Tab	甘草易使鉀離子流失	西藥副作用增加	避免併用
炙甘草	Quinidine		甘草易使鉀離子流失	西藥副作用增加	避免併用
炙甘草	Spironolactone	Spirotone 25mg/Tab	中藥會拮抗利尿劑作用	作用減弱	調整劑量
炙甘草	Trichlormethiazide	Fluitran 2mg/Tab	中藥會產生低血鉀，並拮抗利尿劑作用	作用減弱	調整劑量或 避免併用

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
炙黃耆	<b>Acarbose</b>	<b>Glucobay 100mg/Tab</b>	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
炙黃耆	<b>Detemir Insulin</b>	<b>Levemir 300U/3ml/Penfill</b>	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
炙黃耆	<b>Glibenclamide</b>	<b>Gliben 5mg/Tab</b>	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
炙黃耆	<b>Glimepiride</b>	<b>Grumed 2mg/Tab</b>	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
炙黃耆	<b>Insulin Aspart</b>	<b>NovoRapid 300U/3ml/Penfill</b>	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
炙黃耆	<b>Insulin Glargine</b>	<b>Lantus 300U/3ml/Penfill</b>	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
炙黃耆	<b>Isophane insulin Human</b>		中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
炙黃耆	<b>Metformin</b>	<b>Glucophage 500mg/Tab Amaryl M Tab Galvus Met Tab Janumet Tab Kombiglyze XR Tab</b>	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
炙黃耆	<b>Pioglitazone</b>	<b>Actos 30mg/Tab</b>	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
炙黃耆	<b>Premixed Insulin</b>	<b>NovoMix 30 300U/3ml/Penfill Humalog 25 300U/3ml/Penfill Humalog 50 300U/3ml/Penfill</b>	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
炙黃耆	<b>Regular Insulin human</b>	<b>Insulin Actrapid HM 10mL/Vial</b>	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
炙黃耆	<b>Repaglinid</b>	<b>NovoNorm 1mg/Tab</b>	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
炙黃耆	<b>Sitagliptin</b>	<b>Januvia 100mg/Tab Janumet Tab</b>	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
枳殼	<b>Cyclosporin</b>		枳殼使Cyclosporine 血中濃度增加	西藥療效增加	隔開使用
枸杞	<b>Acarbose</b>	<b>Glucobay 100mg/Tab</b>	枸杞多糖可降血糖，減弱胰臟β細胞損傷。	降血糖作用加成	調整劑量
枸杞	<b>Detemir Insulin</b>	<b>Levemir 300U/3ml/Penfill</b>	枸杞多糖可降血糖，減弱胰臟β細胞損傷。	降血糖作用加成	調整劑量
枸杞	<b>Glibenclamide</b>	<b>Gliben 5mg/Tab</b>	枸杞多糖可降血糖，減弱胰臟β細胞損傷。	降血糖作用加成	調整劑量
枸杞	<b>Glimepiride</b>	<b>Grumed 2mg/Tab</b>	枸杞多糖可降血糖，減弱胰臟β細胞損傷。	降血糖作用加成	調整劑量
枸杞	<b>Insulin Aspart</b>	<b>NovoRapid 300U/3ml/Penfill</b>	枸杞多糖可降血糖，減弱胰臟β細胞損傷。	降血糖作用加成	調整劑量

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
枸杞	Insulin Glargine	Lantus 300U/3ml/Penfill	枸杞多糖可降血糖，減弱胰臟β細胞損傷。	降血糖作用加成	調整劑量
枸杞	Isophane insulin Human		枸杞多糖可降血糖，減弱胰臟β細胞損傷。	降血糖作用加成	調整劑量
枸杞	Metformin	Glucophage 500mg/Tab Amaryl M Tab Galvus Met Tab Janumet Tab Kombiglyze XR Tab	枸杞多糖可降血糖，減弱胰臟β細胞損傷。	降血糖作用加成	調整劑量
枸杞	Pioglitazone	Actos 30mg/Tab	枸杞多糖可降血糖，減弱胰臟β細胞損傷。	降血糖作用加成	調整劑量
枸杞	Premixed Insulin	NovoMix 30 300U/3ml/Penfill Humalog 25 300U/3ml/Penfill Humalog 50 300U/3ml/Penfill	枸杞多糖可降血糖，減弱胰臟β細胞損傷。	降血糖作用加成	調整劑量
枸杞	Regular Insulin human	Insulin Actrapid HM 10mL/Vial	枸杞多糖可降血糖，減弱胰臟β細胞損傷。	降血糖作用加成	調整劑量
枸杞	Repaglinid	NovoNorm 1mg/Tab	枸杞多糖可降血糖，減弱胰臟β細胞損傷。	降血糖作用加成	調整劑量
枸杞	Sitagliptin (100mg)	Januvia 100mg/Tab Janumet Tab	枸杞多糖可降血糖，減弱胰臟β細胞損傷。	降血糖作用加成	調整劑量
高麗參	Acarbose	Glucobay 100mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
高麗參	Acetyl-salicylic acid	Bokey 100mg/Cap.	胃酸，胃蛋白的分泌增加，刺激胃黏膜。	加重潰瘍，甚至引起上消化道出血。	避免併用
高麗參	Acipimox		中藥含Ginsenoside Rb2，促進肝膽固醇分泌排除。	作用加成	調整劑量
高麗參	Amlodipine+Atorvastatin	Caduet	中藥含Ginsenoside Rb2，促進肝膽固醇分泌排除。	作用加成	調整劑量
高麗參	Aspirin 101mg	Bokey 100mg/Cap	人參能抑制血小板的活性，影響NSAIDs的功能、	西藥作用降低	調整劑量
高麗參	Atorvastatin	Lipitor 10mg/Tab Lipitor 20mg/Tab	中藥含Ginsenoside Rb2，促進肝膽固醇分泌排除。	作用加成	調整劑量
高麗參	Cholestyramine		中藥含Ginsenoside Rb2，促進肝膽固醇分泌排除。	作用加成	調整劑量

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
高麗參	Detemir Insulin	Levemir 300U/3ml/Penfill	中藥含Ginsenoside	增強Insulin 作用， 降血糖。	monitor 血 糖
高麗參	Digoxin	Lanoxin 0.25mg/Tab Lanoxin 0.5mg/2mL/Amp	中藥結構類似西藥，西藥濃度增加。	西藥毒性增加	避免併用
高麗參	Ezetimibe+ Simvastatin	Vytorin	中藥含Ginsenoside Rb2，促進肝膽固 醇分泌排除。	作用加成	調整劑量
高麗參	Fenofibrate	Lipanthyl 160mg/Tab	中藥含Ginsenoside Rb2，促進肝膽固 醇分泌排除。	作用加成	調整劑量
高麗參	Fluvastatin	Lescol XL 80mg/Tab	中藥含Ginsenoside Rb2，促進肝膽固 醇分泌排除。	作用加成	調整劑量
高麗參	Furosemide	Rosis 40mg/Tab Rosis 20mg/2mL/Amp	中藥會降低利尿劑的效果	西藥作用減少	調整劑量
高麗參	Gemfibrozil		中藥含Ginsenoside Rb2，促進肝膽固 醇分泌排除。	作用加成	調整劑量
高麗參	Glibenclamide	Gliben 5mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
高麗參	Glimepiride	Grumed 2mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
高麗參	Insulin Aspart	NovoRapid 300U/3ml/Penfill	中藥含Ginsenoside	增強Insulin 作用， 降血糖。	monitor 血 糖
高麗參	Insulin Glargine	Lantus 300U/3ml/Penfill	中藥含Ginsenoside	增強Insulin 作用， 降血糖。	monitor 血 糖
高麗參	Isophane insulin Human		中藥含Ginsenoside	增強Insulin 作用， 降血糖。	monitor 血 糖
高麗參	Metformin	Glucophage 500mg/Tab Amaryl M Tab Galvus Met Tab Janumet Tab Kombiglyze XR Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
高麗參	Morphine	Morphine 10mg/1ml/Amp Morphine 10mg/Tab	使麻醉不完全	降低麻醉效果	避免併用
高麗參	Phenobarbital sodium	Phenobarbital 30mg/Tab	人參使用9-30g時具CNS 抑制作用，兩 者作用加成。	抑制呼吸中樞，危及 生命。	避免併用
高麗參	Pioglitazone	Actos 30mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
高麗參	Premixed Insulin	NovoMix 30 300U/3ml/Penfill Humalog 25 300U/3ml/Penfill Humalog 50 300U/3ml/Penfill	中藥含Ginsenoside	增強Insulin 作用， 降血糖。	monitor 血 糖
高麗參	Regular Insulin human	Insulin Actrapid HM 10mL/Vial	中藥含Ginsenoside	增強Insulin 作用， 降血糖。	monitor 血 糖
高麗參	Repaglinid	NovoNorm 1mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
高麗參	Rosuvastatin.	Crestor 10mg/Tab Robestar 10mg/Tab	中藥具降血脂作用	作用加成	調整劑量
高麗參	Sitagliptin.	Januvia 100mg/Tab Janumet Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
高麗參	Warfarin sodium	Mafarin 5mg/Tab	降低Warfarin 療效	降低Warfarin 療效	調整劑量
麻黃	Amlodipine	Norvasc 5mg/Tab Ampin 5mg/Tab	中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避 免併用
麻黃	Amlodipine+Atorvastatin	Caduet	中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避 免併用
麻黃	Amlodipine+Valsartan	Exforge Exforge HCT	中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避 免併用
麻黃	Atenolol	Ateol 100mg/Tab Ateol 50mg/Tab	中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避 免併用
麻黃	Bisoprolol	Concor 5mg/Tab Concor 1.25mg/Tab Bisol 5mg/Tab	中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避 免併用
麻黃	Bupivacaine	Marcaine 0.5% · 20mL/Vial	未明	增加心律不整的危險	避免併用
麻黃	Bupropion	Wellbutrin Sustained- Release 150mg/Tab	中藥具擬交感神經作用劑的功效	導致高血壓危象，心 跳加快，惡化焦慮	避免併用
麻黃	Captopril	Ceporin 25mg/Tab	中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避 免併用
麻黃	Carvedilol	Syntrend 6.25mg/Tab	中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避 免併用
麻黃	Clomipramine HCl		中藥具擬交感神經作用劑的功效	導致高血壓危象，心 跳加快，惡化焦慮	避免併用

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
麻黃	Clonidine		中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避免併用
麻黃	Digoxin	Lanoxin 0.25mg/Tab Lanoxin 0.5mg/2mL/Amp	ephedrine增加心收縮，興奮迷走神經，久用反抑制。	心律紊亂，尤不宜器質性心臟病者。	避免併用，monitor HR BP
麻黃	Diltiazem	Cardizem 90mg/Tab Diltisser 30mg/Tab	中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避免併用
麻黃	Doxazosin	Dosabin XL 4mg/Tab Doxter 2mg/Tab	中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避免併用
麻黃	Doxepin HCl		中藥具擬交感神經作用劑的功效	導致高血壓危象，心跳加快，惡化焦慮	避免併用
麻黃	Droperidol	Droppedol 5mg/2ml/Amp	未明	增加心律不整的危險	避免併用
麻黃	Duloxetine		中藥具擬交感神經作用劑的功效	導致高血壓危象，心跳加快，惡化焦慮	避免併用
麻黃	Felodipine	Plendil 10mg/Tab Plendil 5mg/Tab	中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避免併用
麻黃	Fluoxetine HCl	Fluoxetine 20mg/Cap	中藥具擬交感神經作用劑的功效	導致高血壓危象，心跳加快，惡化焦慮	避免併用
麻黃	Flupentixol+Melitracen	Deanxit	中藥具擬交感神經作用劑的功效	導致高血壓危象，心跳加快，惡化焦慮	避免併用
麻黃	Furosemide	Rosis 40mg/Tab Rosis 20mg/2mL/Amp	Pseudoephedrine具利尿，擴張腎血管增加血流作用。	利尿作用加成	調整劑量
麻黃	HydrALAZINE	Aprezin 10mg/Tab	中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避免併用
麻黃	Imipramine HCl	Tone 25mg/Tab Tone 10mg/Tab	中藥具擬交感神經作用劑的功效	導致高血壓危象，心跳加快，惡化焦慮	避免併用
麻黃	Indapamide	Nakamide 2.5mg/Tab	中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避免併用

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
麻黃	Irbesartan		中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避免併用
麻黃	Isoniazid	Isoniazide 100mg/Tab	中西藥皆促進神經末梢產生去甲基腎上腺素，造成協同作用	高血壓危象	避免併用
麻黃	Ketamine HCl	Ketalar 500mg/10ml/Vial	未明	增加心律不整的危險	避免併用
麻黃	Labetalol	Latol 200mg/Tab Trandate 25mg/5ml/Amp	中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避免併用
麻黃	Lercanidipine	Zanidip 10mg/Tab	中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避免併用
麻黃	Lidocaine HCl	Lignocaine 2% 100mg/5ml/Amp Xylocaine 2% 400mg/20ml/Vial	未明	增加心律不整的危險	避免併用
麻黃	Loratadine+Pseudoephedrine	LoraPseudo	中藥具擬交感神經作用劑的功效	導致高血壓危象，心跳加快，惡化焦慮	避免併用
麻黃	Methyldopa		中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避免併用
麻黃	Midazolam HCl	Midazo 15mg/3mL/Amp	未明	增加心律不整的危險	避免併用
麻黃	Nicardipine	Perdipine 10mg/10ml/Amp	中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避免併用
麻黃	Nifedipine	Adalat OROS 30mg/Tab Atanaal 5mg/Cap	中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避免併用
麻黃	Oxytocin	Oxocin 10 U/1mL/Amp	中藥具擬交感神經作用劑的功效	可能引起高血壓	監控BP
麻黃	Phenobarbital	Phenobarbital 30mg/Tab	中藥具中樞興奮作用與西藥拮抗	易引起失眠。	避免併用
麻黃	Propofol	Propofol Lipuro 200mg/20mL/Amp	未明	增加心律不整的危險	避免併用
麻黃	Propranolol	Inderal 10mg/Tab Cardolol 40mg/Tab	中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避免併用

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
麻黃	Quinapril		中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避免併用
麻黃	Rifampin	Rifampin 150mg/Cap Rifater S.C.Tab Rifinah 150/Tab Rifinah 300/Tab	中西藥皆促進神經末梢產生去甲基腎上腺素，造成協同作用	高血壓危象	避免併用
麻黃	Ropivacaine		未明	增加心律不整的危險	避免併用
麻黃	Sertraline	You-Jet 50mg/Tab	中藥具擬交感神經作用劑的功效	導致高血壓危象，心跳加快，惡化焦慮	避免併用
麻黃	Spirolactone	Spirotone 25mg/Tab	中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避免併用
麻黃	Sulpiride	Sulpi 50mg/Cab	中藥具擬交感神經作用劑的功效	導致高血壓危象，心跳加快，惡化焦慮	避免併用
麻黃	Theophylline ethylenediamin		中藥具擬交感神經作用劑的功效	中樞神經興奮	調整劑量或避免併用
麻黃	Trazodone	Mesyrel 50mg/Tab	中藥具擬交感神經作用劑的功效	導致高血壓危象，心跳加快，惡化焦慮	避免併用
麻黃	Trichlormethiazide	Fluitran 2mg/Tab	中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避免併用
麻黃	Valsartan	Diovan 160mg/Tab Diovan 80mg/Tab Exforge、Exforge HC	中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避免併用
麻黃	Venlafaxine HCl	Valosine S.R. 75mg/Cap	中藥具擬交感神經作用劑的功效	導致高血壓危象，心跳加快，惡化焦慮	避免併用
麻黃	Verapamil	U-SODIN 5mg/2mL/Amp Cintsu 40mg/Tab Isoptin SR 240mg/Tab	中藥具擬交感神經作用劑的功效	血壓不易控制	監控BP或避免併用
黃芩	Acetyl-salicylic acid	Bokey 100mg/Cap.	未明	增加出血風險	避免併用
黃芩	Cyclosporin		黃芩使Cyclosporine AUC 及血中濃度降低	西藥療效降低	隔開使用

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
黃芩	Enoxaparin sodium	Clexane 60mg/6000U/0.6ml/syringe	未明	增加出血風險	避免併用
黃芩	Warfarin sodium	Mafarin 5mg/Tab	未明	增加出血風險	避免併用
黃柏	Acetyl-salicylic acid	Bokey 100mg/Cap.	黃柏具抗菌，收斂消炎及健胃	改善腹瀉及瘧疾療效	調整劑量
黃柏	Tetracycline		黃柏具抗菌，收斂消炎及健胃	改善腹瀉及瘧疾療效	調整劑量
黃柏	TMP 80mg+SMZ 400mg Sulfamethoxazole+Trimethoprim	Baktar	黃柏具抗菌，收斂消炎及健胃	改善腹瀉及瘧疾療效	調整劑量
黃耆(北)	Acarbose	Glucobay 100mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃耆(北)	Detemir Insulin	Levemir 300U/3ml/Penfill	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃耆(北)	Glibenclamide	Gliben 5mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃耆(北)	Glimepiride	Grumed 2mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃耆(北)	Insulin Aspart	NovoRapid 300U/3ml/Penfill	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃耆(北)	Insulin Glargine	Lantus 300U/3ml/Penfill	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃耆(北)	Isophane insulin Human		中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃耆(北)	Metformin	Glucophage 500mg/Tab Amaryl M Tab Galvus Met Tab Janumet Tab Kombiglyze XR Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃耆(北)	Pioglitazone	Actos 30mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃耆(北)	Premixed Insulin	NovoMix 30 300U/3ml/Penfill Humalog 25 300U/3ml/Penfill Humalog 50 300U/3ml/Penfill	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃耆(北)	Regular Insulin human	Insulin Actrapid HM 10mL/Vial	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃耆(北)	Repaglinid	NovoNorm 1mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃耆(北)	Sitagliptin.	Januvia 100mg/Tab Janumet Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
黃連	Acarbose	Glucobay 100mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃連	Acetyl-salicylic acid	Bokey 100mg/Cap	產生協同作用	改善腹瀉及瘧疾療效	調整劑量
黃連	Detemir Insulin	Levemir 300U/3ml/Penfill	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃連	Glibenclamide	Gliben 5mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃連	Glimepiride	Grumed 2mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃連	Insulin Aspart	NovoRapid 300U/3ml/Penfill	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃連	Insulin Glargine	Lantus 300U/3ml/Penfill	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃連	Isophane insulin Human		中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃連	Metformin	Glucophage 500mg/Tab Amaryl M Tab Galvus Met Tab Janumet Tab Kombiglyze XR Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃連	Pioglitazone	Actos 30mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃連	Premixed Insulin	NovoMix 30 300U/3ml/Penfill Humalog 25 300U/3ml/Penfill Humalog 50 300U/3ml/Penfill	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃連	Regular Insulin human	Insulin Actrapid HM 10mL/Vial	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃連	Repaglinid	NovoNorm 1mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃連	Sitagliptin	Januvia 100mg/Tab Janumet Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
黃連	Tetracycline		產生協同作用	改善腹瀉及瘧疾療效	調整劑量
黃連	TMP 80mg+SMZ 400mg Sulfamethoxazole+Trimetho prim	Baktar	產生協同作用	改善腹瀉及瘧疾療效	調整劑量
當歸	Acarbose	Glucobay 100mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
當歸	Acetyl-salicylic acid	Bokey 100mg/Cap	當歸含Coumarins	增加出血風險	避免併用
當歸	Detemir Insulin	Levemir 300U/3ml/Penfill	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
當歸	Enoxaparin sodium	Clexane 60mg/6000U/0.6ml/syringe	當歸含Coumarins	增加出血風險	避免併用
當歸	Estradiol valerate		中藥含雌性素，與西藥具加成作用	雌激素作用加強	調整劑量
當歸	Estrogen conjugated	Estromon conjugated 0.625mg/Tab Estradiol/MedroxyPROGESTERone : Indivina、Divina、Covina	當歸含Coumarins	增加出血風險	避免併用
當歸	Glibenclamide	Gliben 5mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
當歸	Glimepiride	Grumed 2mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
當歸	Insulin Aspart	NovoRapid 300U/3ml/Penfill	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
當歸	Insulin Glargine	Lantus 300U/3ml/Penfill	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
當歸	Isophane insulin Human		中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
當歸	Metformin	Glucophage 500mg/Tab Amaryl M Tab Galvus Met Tab Janumet Tab Kombiglyze XR Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
當歸	Pioglitazone	Actos 30mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
當歸	Premixed Insulin	NovoMix 30 300U/3ml/Penfill Humalog 25 300U/3ml/Penfill Humalog 50 300U/3ml/Penfill	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
當歸	Regular Insulin human	Insulin Actrapid HM 10mL/Vial	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
當歸	Repaglinid	NovoNorm 1mg/Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
當歸	Sitagliptin	Januvia 100mg/Tab Janumet Tab	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
當歸	Warfarin sodium	Mafarin 5mg/Tab	增加INR，廣泛瘀血。	當歸含Coumarins；使Warfarin作用增強	避免併用
葛根	Cyclosporin		葛根使Cyclosporine AUC及血中濃度降低	西藥療效降低	隔開使用

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
葛根	Detemir Insulin	Levemir 300U/3ml/Penfill	降低細胞對抗胰島素	增加胰島素敏感性	monitor 血糖
葛根	Insulin Aspart	NovoRapid 300U/3ml/Penfill	降低細胞對抗胰島素	增加胰島素敏感性	monitor 血糖
葛根	Insulin Glargine	Lantus 300U/3ml/Penfill	降低細胞對抗胰島素	增加胰島素敏感性	monitor 血糖
葛根	Isophane insulin Human		降低細胞對抗胰島素	增加胰島素敏感性	monitor 血糖
葛根	Premixed Insulin	NovoMix 30 300U/3ml/Penfill Humalog 25 300U/3ml/Penfill Humalog 50 300U/3ml/Penfill	降低細胞對抗胰島素	增加胰島素敏感性	monitor 血糖
葛根	Regular Insulin human	Insulin Actrapid HM 10mL/Vial	降低細胞對抗胰島素	增加胰島素敏感性	monitor 血糖
蒲公英	Amlodipine	Norvasc 5mg/Tab Ampin 5mg/Tab	未明	降血壓作用加成	隔開使用
蒲公英	Amlodipine+Atorvastatin	Caduet	未明	降血壓作用加成	隔開使用
蒲公英	Amlodipine+Valsartan	Exforge Exforge HCT	未明	降血壓作用加成	隔開使用
蒲公英	Atenolol	Ateol 100mg/Tab Ateol 50mg/Tab	未明	降血壓作用加成	隔開使用
蒲公英	Bisoprolol	Concor 5mg/Tab Concor 1.25mg/Tab Bisol 5mg/Tab	未明	降血壓作用加成	隔開使用
蒲公英	Captopril	Ceporin 25mg/Tab	未明	降血壓作用加成	隔開使用
蒲公英	Carvedilol	Syntrend 6.25mg/Tab	未明	降血壓作用加成	隔開使用
蒲公英	Clonidine		未明	降血壓作用加成	隔開使用
蒲公英	Diltiazem	Cardizem 90mg/Tab Diltisser 30mg/Tab	未明	降血壓作用加成	隔開使用
蒲公英	Doxazosin	Dosabin XL 4mg/Tab Doxter 2mg/Tab	未明	降血壓作用加成	隔開使用
蒲公英	Felodipine	Plendil 10mg/Tab Plendil 5mg/Tab	未明	降血壓作用加成	隔開使用
蒲公英	Furosemide	Rosis 40mg/Tab Rosis 20mg/2mL/Amp	未明，蒲公英含鉀	降血壓作用加成，利尿作用加成	隔開使用

中藥名	西藥化學名	院內現有藥品	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	建議處理方式
蒲公英	HydrALAZINE	Aprezin 10mg/Tab	未明	降血壓作用加成	隔開使用
蒲公英	Indapamide	Nakamide 2.5mg/Tab	未明，蒲公英含鉀	降血壓作用加成，利尿作用加成	隔開使用
蒲公英	Irbesartan		未明	降血壓作用加成	隔開使用
蒲公英	Labetalol	Latol 200mg/Tab Trandate 25mg/5ml/Amp	未明	降血壓作用加成	隔開使用
蒲公英	Lercanidipine	Zanidip 10mg/Tab	未明	降血壓作用加成	隔開使用
蒲公英	Lithium carbonate		Lithium 毒性增加	Na 流失	隔開使用
蒲公英	Methyldopa		未明	降血壓作用加成	隔開使用
蒲公英	Nicardipine	Perdipine 10mg/10ml/Amp	未明	降血壓作用加成	隔開使用
蒲公英	Nifedipine	Adalat OROS 30mg/Tab Atanaal 5mg/Cap	未明	降血壓作用加成	隔開使用
蒲公英	Propranolol	Inderal 10mg/Tab Cardolol 40mg/Tab	未明	降血壓作用加成	隔開使用
蒲公英	Quinapril		未明	降血壓作用加成	隔開使用
蒲公英	Spirolactone	Spirotone 25mg/Tab	未明	降血壓作用加成，利尿作用加成	隔開使用
蒲公英	Trichlormethiazide	Fluitran 2mg/Tab	未明，蒲公英含鉀	降血壓作用加成，利尿作用加成	隔開使用
蒲公英	Valsartan	Diovan 160mg/Tab Diovan 80mg/Tab Exforge、Exforge HC	未明	降血壓作用加成	隔開使用
蒲公英	Verapamil	U-SODIN 5mg/2mL/Amp Cintsu 40mg/Tab Isoptin SR 240mg/Tab	未明	降血壓作用加成	隔開使用

製定日期：101.7.10，修定日期：105.12.23(第二版)，107.6.19(第三版)，112.3.15(第四版)

參考來源：行政院衛生署中醫藥資訊網：<http://www.ccmp.gov.tw/index.asp>